

Rühm	Ligi nimi	Teaduslik nimi	Kaitsekate gooria	Punase nimestiku kategooria	Eritunnused	Elupaik	Täpsustatud elupaik/kasukoht	substraat/pesa/vastsete asukoht	Parim määramisperiood	Sarnased liigid	Märkused	Leiukohtade arv EELISE andmetel
Amfiibid ja roomajad	vaskuss	Anguis fragilis	III kat		Vaskuss on läikiva, jämedat vasktraadijuppi meenutava pruunika kehaga jalutu sisalik. Pulmarüüsis isasel vaskussil võivad kehapiinda kaunistada sinised täpid.	mets, niit, põld, aed	Niisketes kui ka kuivades laialehistes- ja segametsades, aasadel, põldudel ja aedades, kompostihunnikutest.		Oktoober kuni märts-aprill talveunes.	Nastik ja rästik - lähemal vaatlemisel on vaskuss selgelt äratuntav oma sisalikule omase peakuju poolest, samuti värvi/läike ja suuruse poolest. Erinevalt roomajatest on vaskussil ka silmalaug, väga lähedalt vaatamisel on vaskussil näha ka kõrvad.	Vaskuss on küllaltki varjatud eluviisiga. Varjab end kõdunenud kändudes, maha langenud puutüvede, puukoore või lamedate kivide all. Nagu teistegi sisalike puhul võib ka vaskuss endalt (röövloma kätte jäädes) saba heita.	üksikud
Amfiibid ja roomajad	kõre	Bufo calamita	I kat	Ohustatud	Jässakas ja suhteliselt lühijalgne. Silma vikerkest kollakas-kuldne või rohekas, pupillid horisontaalsed. Seljal tavaliselt peenike kolane pikitriip. Nahk krobeline, pruunikas, hall või rohekas, kõbrukestel pisikesed punased täpid. Keha alapoole nahk on hallikasvalge ning pruunikate või rohekate laikudega. "Laulab" päikeseloojangu ajal maikuu. "Laul" on vali korduv kõrin, mis meenutab öösorri laulu.	rannik, niit, karjäär, kivi, asula, aed	Liivastel rannikualadel, rannaniitudel ja -karjamaadel. Vanades liiva- ja kruusakarjäärides ning kivimurdudes, ehituspiltsidel ja aiandites. Kõre talub peale mageda vee ka riim- ning soolast vett.		Septembris-oktoobris lähevad ilmade jahenedes talveunne, aktiivseks hakkavad aprillis. Koevad ja "laulavad" mais.	Teised kärnkonnad, kuid kõre on kollase seljatriibu tõttu kergesti eristuv. "Laulu" poolest sarnane öösorriga, aga elupaigad on erinevad ja kõre "laulab" selgelt veekogudes, mitte kuival maal.	Enamasti ööloom, tuvastatav hääle järgi. Sobivad kivide, puurontide, lauajuppide või muu taolise olemasolu korral eelistavad kõred päeval nende alla peitu pugeda. Lääne-Eestis ja saartel.	keskmiselt
Amfiibid ja roomajad	rohe-kärnkonn	Bufo viridis	I kat	Äärmiselt ohustatud	Sale krobeline nahaga konn. Selg helehall või oliivjas, erineva kujuga tumeroheliste kuni mustade laikudega ning oranžide või punaste täppidega. Silmapupill horisontaalne. Mida vanem on konn, seda suuremad on laigud. Kõht on valge, mustade täppidega. Kudunööris on munad kahes reas.	aed, põld, niit, veekogu	Liivase pinnasega aladel, tihedalt inimasustega seotud, aedades, põldudel, niitudel. Koeb madalaveelistes päiksepaistelistes lompides ja tiikides, enamasti loomade jootmiskohad ja ajutised veekogud karjamaadel.		Septembri lõpust märts-aprillini on talveunes. Koevad ja "laulavad" hiliskevadel, aprillis-mais.	Erinevused kõrest: seljamuster kontrastsem (kahvatul taustal on selgepiirilised, rohekad, tumedaservalised laigud); peaaegu kunagi ei ole kollast pikitriipu; tagajäsemel tunduvalt pikemad, pikima tagavarba alapoole kõbrukesed on paaritud. Sarnane liik on ka mudakonn, aga tal on vertikaalne silmapupill. "Laul" sarnaneb väikekoovitaja ja kaerasori lauluga.	Tegutses videvikus ja öösel. Talveunes on närliliste urgudes, aukudes või pehmes pinnases. Eestis tõenäoliselt väljasurnud. Viimased leitud teated Piirissaarelt. Levik on eestis piirunud Peipsi ja Pihkva järve äärsete liivaste alade ja aedadega.	üksikud
Amfiibid ja roomajad	kivisalisik	Lacerta agilis	II kat	Ohualdis	Värvus on varieeruv. Oluline on heledate laikude muster külgedel. Isane kivisalisik on paaritumise ajal roheliste külgedega, muidu roheka kõhualusega. Võib esineda ühetoonilisi kivisalisikke, nt üleni pruune või üleni rohelisi.	muu	Seotud päikesele avatud lahtise liivaga aladega.		Talveunes oktoobrist aprillini.	Arusalisik – tema kehal puuduvad hleddad laigud, isase kõht on kollakas-oranžikas ja emasel valge.		vähe
Amfiibid ja roomajad	arusalisik	Lacerta vivipara	III kat		Täiskasvanud arusalisik on 10-16 cm pikkune. Jässakad, lühikeste jalgadega sisalikud. Tavaliselt pruunid, kuid esineb ka halle, oliivkarva pruune ja musti. Seljal ja külgedel kollased/pruunikad triibud. Isastel on eredad kõhualused - kollakad või oranžikad, harva ka punakad. Emasel kõht valge.	muu	Elupaikade suhtes väga leplik ja võib elada lausa rabas, rääkimata kodu- või kiviaiast.		Talveunes oktoobrist märtsini.	Kivisalisik – temal aga külgedel heledad laigud, isasel kõhualune rohekas.		vähe
Amfiibid ja roomajad	nastik	Natrix natrix	III kat		Halli või pruuni värvi, mustade tähnedega, harvem üleni must. Kollane kaelavõru. Keha alumine pool on kollakas või valge koos must-valge mallelauda moodi mustriga.	niit, veekogu	Niisketel heina- ja karjamaadel, mis asuvad seivaga veekogu ääres.		Talveunes oktoobrist-novembrist märts-aprillini.	Rästik – tema seljal siksak joon. Vaskuss – erineb sisalikule omase peakuju ja värvuse/läike poolest.		vähe
Amfiibid ja roomajad	mudakonn	Pelobates fuscus	II kat	Ohualdis	Ümar keha. Pealael silmade vahel kumerus. Värvus: hall, helepruun, kollakas või valkjas, tumedamate pruunide tähnide või laikudega, mis võivad moodustada marmorja mustrit. Külgedel väikesed oranžid täpid. Silma vikerkest kuldne, oranž või vasekarva, pupill vertikaalne.	nõmm, mets, park, asula, põld, veekogu	Laugedel avatud aladel, luidel, nõmmedel, hõredates männimetsades, parkides ja kultuurmaist. Eestis enamasti ekstensiivsetel sibula- ja kartulipõldudel. Koevad tiikides, linaleotusaukudes jm väikestes laugetes kalastega kalivabades veekogudes.		Kevadel, aprillis-mais kudemisajal häältsemas: koputuselaadsed häältseused "klokk-klokk-klokk". Koorunud kullest ajal juunis - kullest on erakordselt suured - mitu cm pikad.	Teised konnad – mudakonnal on vertikaalne pupill.	Täiskasvanuid näeb väljas öösiti, kui nad vaikselt kruusateedel või ekstensiivsetel sibula- ja kartulipõldudel toituvad. Eestis on eitjooline asurkond Piirissaarel.	keskmiselt

Amfiibid ja roomajad	rabakonn	Rana arvalis	III kat		Selg pruun, hallikas või kollakas-enamasti selgelt laiguline. Kõht hele, mustrita. Küljed laigulised. Isased on pulmade ajal kergelt hõbedased kuni lausa sinist tooni. Tagajalal suur põiakõbruke.	soo, põld, niit, veekogu	Niisketel aladel nagu rabad, niisked põldud ja rohumaad, veekogude ümbrused, kevaditi ülejutatavad alad.		Koeb aprillis, mai alguses.	Rohukonn – tema on veidi suurem, pikemate jalgadega ja enamasti kirju kõhuga.		keskmiselt
Amfiibid ja roomajad	veekonn	Rana esculenta	III kat		Nn. roheline konn. Roheline, tumedate või mustade täppidega. Kõht valge, hele- või tumehall, tumedate täppidega. Sigimisperioodil isased helerohelised või kollakad, hallide pulmatüügastega. Reie tagaküljed kollased või oranžid, pruuni või musta marmorja mustriaga.	veekogu, kallas	Peamiselt erinevates veekogudes ja nende kallastel (armastab päksepaistelisi veekogusid).		Enam vähem kogu vegetatsiooniperioodi vältel päikese paistelises veekogudes või nende kallastel.	Tiigikonn ja järvekonn.		vähe
Amfiibid ja roomajad	tiigikonn	Rana lessonae	III kat		Selg roheline või pruun tumepruunide või mustade täppide ja laikudega. Võib esineda erkroheline seljatrip. Isased võivad sigimisajal olla üleni heledad kollakasrohelistes. Kõht valge õrnade hallikate laikudega. Valkjad kõlapõied.	veekogu, kallas	Peamiselt erinevates veekogudes ja nende kallastel (armastab päksepaistelisi veekogusid).		Enam vähem kogu vegetatsiooniperioodi vältel päikese paistelises veekogudes või nende kallastel.	Veekonn ja järvekonn.		palju
Amfiibid ja roomajad	järvekonn	Rana ridibunda	III kat	Puuduliku andmestikuga	Keha suur ja robustne, nahk mõnikord üsna näseline. Selg roheline või oliivikarva, tumedate täppidega. Ninamik terav. Kõlapõied hallikad, reite tagaküljed valkjad, helehallid või oliivikarva, tumeda marmorja mustriaga.	veekogu, kallas	Tugevalt veega seotud, järvekonna leiab erinevate veekogude kallastelt ja veest. Armastab päksepaistelisi veekogusid ja peamiselt päevaaktiivne loom. Piirandades kus levila kattub veekonna või tiigikonnaga eelistab jõgesid ja järvi (teised kaks liiki siis pigem väikeveekogudes). Mõnelpool võib kasutada ka riimveelisi veekogusid.		Rohelisi konni võib kohata enam vähem kogu vegetatsiooniperioodi vältel päikese paistelises veekogudes või nende kallastel. Nad on aktiivsed just päeval.	Tiigikonn ja veekonn. Järvekonn on üldjuhul suurem, väikeste tagajala põiakõbrukestega ja pikkade jalgadega (kui reis selgroo suhtes küljele 90 kraadise nurga alla painutada siis kannad jäävad üksteise peale) ning tal on hallid kõlapõied. Kuna järvekonn annab tiigikonna ja veekonnaga hübriide, siis täie kindlusega on rohelised konnad määratavad vaid DNA testiga.		üksikud
Amfiibid ja roomajad	rohukonn	Rana temporaria	III kat		Nn. pruun konn. Selja värv varieerub: pruun, punakas, roosakas, oliivikarva või kollane (sageli tumedate laikudega). Kurgualune ja kõht alati vähemalt osaliselt kirjud, valge, kollakas, roosakas. Tagajala põiakõbruke väike. Tagajala ette painutamisel ulatub kand vaevalt üle ninamiku tipu. Kulleseid on raske määrata.	aed, asula, mets, niit	Sage aedades ja väikeasulates. Asustab ka metsi, rohumaid. Sigimisajal peamiselt maismaal.		Märtsi lõpus või aprilli alguses liiguvad sigimisveekogudesse. Rohukonn koeb enamasti aprillis ja täiskasvanuid võib siis kohata veekogudes. Noored lahkuvad veekogust juulis-augustis.	Rabakonn - temal on jalad enamasti lühemad ja suur põiakõbruke.	Peale kevadist sigimist kohtab maismaal ringi hüppamas. Sigimisel koetakse kudu pallidena.	keskmiselt
Amfiibid ja roomajad	harivesilik	Triturus cristatus	II kat	Ohualdis	Täiskasvanud isend on kuni 15 cm pikk. Sisalikku meenutav loom. Maismaaperioodil nahk must krobeline (meenutab kärnkonna nahka) ja oranž mustade täppidega kõht. Kevadel on isastel loomadel seljal pikk hambuline hari mis katkeb saba alguskohal ja sabal on eraldi hari. Pulmarüüs isastel on saba mõlemal küljel sinakas triip.	veekogu	Kaladeta liiva- või savi põhjaliste väikeveekogude ümbruses. Parim veekogu: päksele avatud laugete kallastega ja õrna veetaimestikuga. Eelistatud on veekogud millest 50 m raadiuses on ka metsa ja rohumaad - seal täiskasvanud toituvad ja talvituvad.		Täiskasvanud harivesilikud saabuvad sigimisveekogudesse enamasti mais ja viibivad seal juuni lõpu juuli alguseni. Noored vesilikud lahkuvad veekogudest enamasti oktoobris.	Tähnikesilik - tema on pisem, enamasti beeš ja sileda nahaga.	Enamus leide Lõuna- ja Kagu-Eestis.	palju

Amfiibid ja roomajad	tähnikesiilik	Triturus vulgaris	III kat		Vastsed on õrnad kuni 8 cm pikkused beešid loomad, kellel on pea külgedel välislopused ja haprad jalad (esjalad arenevad enne tagajalgu). Saba uimekurrul enamasti tumedad tähnid ja saba lõppeb niitja jätkega.	veekogu, soo, asula	Mitmekesiste väikeveekogude ümbruses (sobivad aiatiigid, väikejärved, kopra üleujutused, soostuvad alad, sood jne). Sobivaimad tingimused: päiksele avatud lauge kaldaga ja õrna kuid tiheda veetaimestikuga veekogu. Talvitumiseks kasutab väikeloomade urge, erinevaid kõdupuidu aluseid, aga ka väikemajapidamiste keldreid.		Sigimisveekogudes enamasti aprillist mai lõpuni. Noored lahkuvad veekogudest enamasti septembris.	Harivesiilik - tema on suurem, must ja krobeline nahaga.	Nii mandril kui saartel. Selge veega veekogus sigimise ajal kenasti vaadeldavad. Täiskasvanuid ja noori on lihtsam leida just veest. Maismaal on nad enamasti üsna märkamatud.	keskmiselt
Amfiibid ja roomajad	rästik	Vipera berus	III kat		Pruunika või terashalli värvusega. Emased pruunikamad (emaste taustavärv võib olla ka kollakas või isegi punakas). Seljal on tume siksak joon terve keha ulatuses, keha külgedel on tavaliselt ka ovaalsed täpid siksaki kõrval. Tema peas on X või V-kujuline kujund.	muu, kallas	Rohustes, paraja niiskusega mitmekesiste kooslusega elupaikades, kus on tingimused enda soojendamiseks ja jahi pidamiseks. Harva ka veekogude kallastel.		Ärkavad talveunest aprillis. Talveunne jäävad uuesti oktoobris-novembris.	Nastik ja vaskuss - lähemal vaatlusel on rästiku peamiseks tunnuseks värv ja siksak joon seljal.	Rästik pole agressivne, ta ründab ainult siis, kui on kas nurka surutud või otseselt ohustatud.	vähe
Amfiibid ja roomajad	hariilik kärnkonn	Bufo bufo	III kat		Väga krobeline nahaga loom. Tavaliselt nahk pruunikas, kuid on ka liivatooni, halle või punakaid isendeid. Kõht hallikas, enamasti mustiline. Silmad oranžikaskuldsed, horisontaalse pupilliga.	muu	Väga mitmekesistes paikades. Kuivades inimeste poolt hüljatud aladel (võsastuvad karjamaad, vanad talukohad jms. kohad), aga ka inimasulatest ja metsadest.		Peamine sigimine on aprilli lõpus, mai alguses lahkuvad täiskasvanud veest ja on maismaal aktiivsed septembri alguseni.	Esmapiilgul teiste kärnkonnadega, kuid erinevat kahest ülejäänud liigist on enamasti seljapoolt ilma muustrita. Samuti on kahest ülejäänud liigist palju tavalisem.	Moonde läbinud isendeid leiab veekogu lähedusest niiske ilmaga.	keskmiselt