

Rühm	Ligi nimi	Teaduslik nimi	Kaitsekate gooria	Punase nimestiku kategooria	Eritunnused	Elupaik	Täpsustatud elupaik/kasvukoht	substraat/pesa/vastsete asukoht	Parim määramisperiood	Sarnased liigid	Märkused	Leiukohtade arv EELISE andmetel
Kalad	tuur, atlandi tuur	Acipenser sturio	IIkat		Seljal, külgedel ja kõhuserval 5 pikirida luukilpe. Nimamiku tipu ja suu vahel 4 poiset (alalõua kida). Selg oliivroheline või hallikaspruun, küljed sinakad, kõht valkjas.	veekogu	meri, jõgi. Koelmuteks on üle 2 m sügavused, kiire voolu ja kõva põhjaga kohad.		koeb jões juunis-juulis. Jõkkes võib alata juba suurvee ajal.		Põhjalähedastes kihtides. Tegutseb nii päeval kui öösel. Välimuse põhjal sugupooli ei erista.	puuuvad
Kalad	tõugjas, hariik tõugjas	Leuciscus aspius	IIkat	Puuduliku andmestikuga	Selg hallikassinisest tumeroheliseni, küljed hõbedased (vanematel kollakad), kõht valge. Sabauim suure väljalõikega, pärakuim nõgusa välisservaga. Silmad hõbedased või kollakad.	veekogu	jõgi, suurem järv, madala soolususega mereleht.		toitumisaeg mai-oktoober	Säinas - pärakuime serv on sirge. Turb - tema pärakuime välisserv on aga kumer lõikega.	Peamiselt Peipsi vesikonnas.	vähe
Kalad	hink	Cobitis taenia	IIkat	Puuduliku andmestikuga	Kuni 14 cm madu meenutav kala. Üldiselt kahvatukollane, kaetud pruunide laikudega (muudab värvi vastavalt elupaigale). Silmad kõrgel. 3 paari poiseid.	veekogu	selgeveeline ja madal järv ning aeglase vooluga jõgi, mõnikord ka riimveeline mereleht ja lahesopp (liivane või savine põhi).		koeb maist-juulini veetaimede vahel.		Õise eluviisiga.	keskmiselt
Kalad	võldas, hariik võldas	Cottus gobio	IIkat		Selg ja küljed pruunikad kuni hallid, tumedate korrapäratute laikudega, kõht kollakas kuni valge. Silmad kõrgel pealael. Rinnaülemised suured, ümardunud, ulatuvad pärakuni. Uimed heledad, tumedate täpiiridadega.	veekogu	oja, jõgi, järv, riimvesi (hapanurikastes jahedates tingimustes, kruusane-kivine põhi)		aprilli teise või mai esimesel poolel koeb. Muidu õise eluviisiga.		Puudub Hiiumaa ja väiksemate saarte veekogudes.	keskmiselt
Kalad	vingerjas	Misgurnus fossilis	IIkat	Puuduliku andmestikuga	Kollakaspruuni seljaga musta-kollasetriibuliste külgedega ja pruunide uimedega peenike kala (15-18 cm pikk). Suu juures mitu paari lühikesi tumedaid jätkeid (poised). Saba on ümardunud.	veekogu	soostunud kallastega jõgi, mudase põhjaga järv		koeb aprilli lõpus ja mais	Trulling - temal selg ja küljed hallikaspruunid või pruunid suurte tumedate korrapäratute laikudega.	Peamiselt Peipsi vesikonnas.	vähe
Kalad	säga	Silurus glanis	IIkat	Ohustatud	Selg tumehall, helehallit marmoreeritud, pea ühtlaselt mustjashall, küljed kollakad, tumedate laikudega. Lai lame pea. Pärakuim pikk, puutub kokku sabauimega. Silmad suunurkadest veidi kõrgemal. Ülahuul suunurkades pikad poised, alalõual kaks paari lühikesi poiseid.	veekogu	järv, suuremate jõgede sügavamad osad (eelistab mudast põhja, kus leidub õõnsusi varjumiseks, astanguid, puujuurte aluseid ja taimestikku)		koeb ilmselt juunis		Eestis levila põhjapiiril. Peamiselt Peipsi vesikonnas.	puuuvad
Kalad	harjus	Thymallus thymallus	IIkat	Ohualdis	Selg hallikaspruun, küljed hõbehallid, mõnikord harvade mustade täppidega. Kõht valge või hõbejas. Soomused paiknevad sirgetes pikiridades. Selja- ja rasvauim on mustade laikudega (sisaldavad sinist, punast, rohelist ja violetset tooni).	veekogu	jõgi (puhas ja jahedaveeline, taimestikuaesed kruusase-liivase põhja ja kiire vooluga jõeksi eelistab)		koeb mais pärast kevadist suurvett. Kolemü on sagedamini kruusasel põhjal väga madalas vees.		Põhja- ja Lõuna-Eesti jõgedes, ka Peipsi lõunaosas.	vähe
Kalad	meritint	Osmorus eperlanus		Ohulähedane	Iseloomulik poolläbipaistev keha. Selg hallikas-salatroheline, külgedel hõbejas vööt, kõht tuhmit hõbevalge, uimed läbipaistvad.	rannik, veekogu	Hoidub rannikuvettesse, lahtedesse ja jõesuudme piirkonda.		Koelmupiirkonda liigutakse juba jaanuaris-veebruaris, kudemine ise keskmiselt aprillis.		Tähtsamad esinemisalad: Pärnu laht, Matsalu laht, Haapsalu laht ning Narva jõe alamjooks ja laherannik.	
Kalad	meriforell	Salmo trutta		Ohulähedane	Keha pisut järsakam ja sabavars jämedam kui lõhel. Seljaüm tähniline. Sabauime serv tavaliselt sirge või kumer. Suu ulatub silmast tahapoole. Kummalgi küljel 15-16 sinakashalli laiku ja rohkesti punaseid täppe.	veekogu, rannik	Meri. Jõgi ja oja kudemiseks		Jõkkes algab augusti lõpul-septembris. Kudemine oktoobri teisest poolest novembrini.	Lõhe	Merest jõkke või oja kudema tulev siirdkala.	

Kalad	jõeforell	Salmo trutta fario		Ohulähedane	Keha külgedel lisaks mustadele ja pruunidele täppidele ka punased. Täpid ja laigud piiratud enamasti heledate rõngastega. Piki küljejoont karminipunased täpid sirge reana.	veekogu	jõgi, oja (selge, jahe, hapnikurikas vesi). Elupaigaks valib jõelõigu, kus on võimalik varjuda puutüvede või kivide läheduses. Kudemiseks vaja kruusase põhjaga piirkonda.		koevad novembrist veebruarini (olenevalt temperatuurist)	Meriforell - tema pole eriti värvikirev.	Forelli paikset vooluvetes elav vorm. Piir meriforelli ja jõeforelli vahel on ebamäärane: meriforell võib jääda pärast kudemist jõkke elama, jõforell aga minna pärast kudemist merre, st nad võivad muutuda siirdelkalast paikseks kalaks ja vastupidi	
Kalad	peipsi siig	Coregonus lavaretus maraenoides		Äärmiselt ohustatud	Selg oliivroheline või tumedam sinakasroheline, küljed helgivad hõbedaselt. Rinna ja kõhuuimed punakad, tipus tumedamad. Rasvauim (saba ja seljauime vahel).	veekogu	järv, eelistab jahedat hapnikurikast vett, ent talub ka kehvemaid elutingimusi.		koeb tavaliselt oktoobri lõpust-novembri algusest 3-4 nädala jooksul, mõnikord isegi jää all	Noorte peipsi siigadele on sarnased rääbised, aga nende uimedel pole punakat värvust, uimed on kas rohekashallid või värvusetud.	Kujunes välja Peipsi järves pärast viimast jääaega. Asustab Peipsi järvega seotud veekogusid. Asustamise järle püsima jäänud ka Saadjärve ja Vagula järve.	
Kalad	peipsi tint	Osmerus eperlanus morpha spirinchus		Äärmiselt ohustatud	Sale, üsna läbipaistev keha (5-11 cm pikk). Suur suu. Selg kollakashall, küljed hõbedased.	veekogu	järv		koeb pärast jää minekut		Peipsi-Pihkva järv, Võrtsjärv, Vagula järv. Reeglina koeb vaid kord elus.	
Kalad	löhi	Salmo salar		Äärmiselt ohustatud	Rasvauim. Keha külgedel tähnid, mis asuvad enamuses ülalpool küljejoont. Sabauim suure sälguga.	veekogu, rannik	meri, jõgi		kolemutele siirdub oktoobris-novembris	Meriforell	Põhja-Eesti jõed	