

Rühm	Ligi nimi	Teaduslik nimi	Kaitsekate gooria	Punase nimestiku kategooria	Eritunnused	Elupaik	Täpsustatud elupaik/kasvukoht	substraat/pesa/vastsete asukoht	Parim määramisperiood	Sarnased liigid	Märkused	Leiukohtade arv EELISE andmetel
Linnud	kanakull	Accipiter gentilis	Iikat	Ohulähedane	Aastaringelt sarnases sulestikus. Pealtpool pruunikas, altpool kontrastselt tumedatriibuline. Emaslind on isaslinnust märkimisväärselt suurem. Silmad, nokatüvi, jalad kollased, nokaots must.	mets, park, põld	Pesitseb suuremates metsades, võib pesitseda ka suuremates linnaparkides, sageli kultuurmaastikus saagijahil		Eestis võib kohata aastaringelt, meil pesitsevad linnud üldiselt lõunapoolsele suundule. Talveks lisandub meile põhjapoolt sissereändajaid.	Raudkull - lennus väga sarnane kanakulliga, kuid väiksem	Kevadel on kanakull territooriumil päris häälekas ning ka poegade kisa on kaugele kuuldav. Ühel paaril on tihti mitu pesa, mida kasutatakse erinevatel aastatel. Pesad ehitavad nad üldjuhul ise, kuid on täheldatud ka teiste lindude pesade kasutamist.	palju
Linnud	raudkull	Accipiter nisus	IIikat		Isaslind on umbes veerandi jagu emaslinnust väiksem. Isaslinnu vöödiine alapool on roostepunane, emaslinnul hallikasvalge. Emaslinnul on ülalpool hallikaspruun, saba on tumehall ja harvade põiktriipudega. Noorlind sarnaneb täiskasvanud emaslinnuga, kuid tema alapool on tumedamad/valgemad ning ülalpool kollakaspruun.	mets, põld, asula	Elab peamiselt tihedates kuuse- ja kuusesegametsades ning enamasti metsa servades. Harvemini pesitseb tihedas männinoorendikus või kuivendatud soomännikus. Pesapu sageli väikese lagendiku või kraavi ääres. Saagijahil sageli kultuurmaastikus, talvisel ajal sageli asulates ja linnaparkides.		Eestis osaliselt paigalind. Minema rännanud linnud tulevad pesitsuskohtadesse tagasi märtsis-aprillis. Sügisränne algab augustis ja kestab oktoobrini.	Kanakull - raudkullist märgatavalt suurem ja tugevama kehaehitusega.	Kullistest üks väiksemaid, pistrikest eristab suhteliselt laiad ja ümara otsaga tiivad.	vähe
Linnud	karvasjalg-kakk	Aegolius funereus	Iikat	Ohualdis	Suure, ümmarguse peaga rästasuune kakk. Kollased silmad, näoovaalid on heledad, tumedamate valgetähniiste servadega. Keha pealmine pool tumeruun heledate laikudega. Kõhu alumine pool hele, tumedate ebakorrapäraste triipudega. Isas- ja emaslind on sarnased. Laul kergesti äratuntav.	mets	Elupaigana eelistab palumetsi. Pesitseb peamiselt vanades mustrahni pesaõõnsustes. Samuti pesakastides.		Eestis peamiselt paigalind, seega aasta läbi.		Õise eluviisiga, periooditi ka päikese töusu ja loojangu ajal tegutsev lind.	keskmiselt
Linnud	alk	Alca torda	Iikat	Ohualdis	Keskmise suurusega lind. Lennul näib ta jässaka ja lühikesena. Linnu puhke- ja hundsulestikud on suhteliselt sarnased. Hundsulestikus algi ülalpool, saba, pea, kael ja tiibade pealmine pool on mustad. Nokk ja jalad mustad, noka ots üsnagi tõmp. Tiiva tagaservadel, noka tipu lähedal ja silmadest nokani on valge triip. Linnu alapool, rinnaesine ja tiibade alumine pool on valged. Puhkesulestik erineb hundsulestikust valgete põskede, kurgualuse ja kaela esikülje poolest.	veekogu, rannik	Avamere liik, tegutseb kivistel rannakajajudel ja kaldapealsetel.		Eestis võib teda merel kohata aprillist oktoobri-novembrini.		Moodustab kolooniaid.	üksikud
Linnud	jäähind	Alcedo atthis	Iikat	Ohulähedane	Kannavad aastaringelt samasugust ülivärvilist sulestikku. Rinnapool on oranžikas-punane ja selg neoonsinine.	veekogu, paljak/paljand	Eelistavad puhtaid ja kohati madalaid, kuid kõrgemate kallastega vooluveekogusid. Klassikaliste elupaikadeks on liivakivi paljanditega Lõuna- ja Kagu-Eesti jõed.		Eestisse saabuvad tavaliselt märtsis-aprillis. Regulaarne kuid väikesearvuline talvituja.		Äärmiselt arglik, ohtu märgates põgeneb läbilõikavate kriisete saatel.	vähe
Linnud	soopart	Anas acuta	Iikat	Ohualdis	Keskmise suurusega, pika sihvaka valge kaela, pruuni pea, ja valge kõhualusega. Küljed hallid ning saba pikk, kitsas ja terava kujuga. Tiiva värvides must ning kollakasvalge. Emaslinnud on samuti nagu enamikel partidel valdavalt pruunikad.	veekogu, soo	Peamiselt järvedel, kitsastes lahtedes, rabades, soistel aladel ning jõesuudmetes. Suvel eelistab vähesel taimestikuga avaraid ja niiskeid soiseid alasid. Talveperioodil eelistab sisemaa mageveekogusid.		Saabub Eestisse märtsis-aprillis ja lahkuvad Eestist septembris-oktoobris.			vähe

Linnud	väike-laukhani	Anser erythropus	I kat	Äärmiselt ohustatud	Kõige väiksem hani. Nökk väike ja lühike, valge lauk ulatub peaaegu pealaeni. Oluline määramistunnus on kollane silmarõngas.	niit	Rändeperioodil nii looduslikel rannarohumaadel kui ka kultuurrohumaaal.	Eestis kohatakse vaid väikeid salkasid läbirändel aprillis–mais või septembris-oktoobris.	Suur-laukhani - väike-laukhanest märksa suurem, kollane silmarõngas puudub, valge lauk ulatub otsmikuni.	Väga haruldane liik.	vähe
Linnud	nõmmekiur	Anthus campestris	IIkat	Ohualdis	Sulestik liivkollane. Selg pruunikas ja alapool heledam ilma mustrita. Pugaalal vähesed kitsad triibud. Jalad helepunased. Isas- ja emaslind välimuselt ei erine.	nõmm, raiesmik	Liivased nõmmemaastikud, männimetsa raiesmikud, rannalivikud ja luided.	Saabuvad Eestis mai algul ja lahkuvad augustis või septembris.	Teistest kiirudest eristab peaaegu täielik triipude puudumine rindmikul.	Elupaigas esineb sageli lahtist liiva. Tegutsseb peamiselt maapinnal, kus ta jookseb kiiresti ja viibutab saba üles–alla.	üksikud
Linnud	randkiur	Anthus petrosus	IIkat	Ohualdis	Ülapool oliivipruunikas, roheline varjundi ja tumedate triipudega. Alapool on valkjas, punaka varjundi ja laiade ebamääraste triipudega.	veekogu, rannik	Avamere piirkonnas kaljusel või kivisel mererannikul.	Saabub märtsi lõpul või aprilli algul. Lahkub septemбри lõpul või oktoobris.			vähe
Linnud	kaljukotkas	Aquila chrysaetos	I kat	Ohualdis	Vanalinnud on tumepruunid heledamate suleääristega, roostja lagipea ja ülakaelaga. Noorlinnud on välimuselt nagu vanalinnud, ainult neil on valged tiivalaugud, valged „püksid“ ja valge sabaüviki. Emaslinnud on tunduvalt suuremad kui isaslinnud.	soo	Peamiselt soosalad.	Paigalind.	Hiireviu, merikotkas.	Pesa ehitab peaaegu alati tugevate okstega põlismäni otsa.	keskmiselt
Linnud	suur-konnakotkas	Aquila clanga	I kat	Äärmiselt ohustatud	Tumedates, mustjas-pruunides toonides, sabal ja tiibadel on üksikud valged alad, kaugelt näib üleni tumedana. Tiivaalune paistab ühtlaselt mustana.	niit, mets, soo, veekogu	Veekogude ja märgalade läheduses niitudel, pesitseb soistes lehtmetsades.	Saabub märtsi lõpus, lahkuvad septembris. Üksikuid isendeid võib kohata ka oktoobris.	Väike-konnakotkas - tiiva all selgelt näha kontrast katte- ja hoosulgedel vahel, kaljukotkas	Väga haruldane liik.	vähe
Linnud	väike-konnakotkas	Aquila pomarina	I kat	Ohulähedane	Tumepruunides toonides, altnaates alltiiva kattesuled šokolaadpruunid, hoosuled aga tumepruunid.	põld, niit, soo, mets	Kultuurmaastikud, niitude, jõeorude ja soodega vahelduvad segametsad.	Saabub aprilli alguses ja lahkuvad septembris.	Suur-konnakotkas, hiireviu, kaljukotkas	Peamiselt mandriosas üldlevinud harv hauelind, kuid samas meie kõige arvukam kotkas. Pesa asub tavaliselt mõne vana kuuse otsas.	palju
Linnud	kivirullija	Arenaria interpres	IIkat	Ohualdis	Välimuselt kirju. Peas on musta-valge triibu muster, mis ulatub külgedele. Keha pealpool punakaspruun koos mustade triipuega. Keha alapool on valge. Jalad lühikesed. Emas- ja isaslind on sarnased.	veekogu, saar	Avamere kruusased rannad ja laiud	Saabub aprilli lõpul-mai alguses ja lahkuvad augustis-septembris.		Väikesearvuline, pesitseb üksikute paaridena	keskmiselt
Linnud	sooräts	Asio flammeus	IIkat	Ohustatud	Sale, pikkade ja kitsate tiibadega. Istuval linnul näha suuretähneline ja laiguline sulestik. Silmad kollased. Kõrvad tillukesed. Kõht pigem hele.	niit, rannik, soo, saar	Rabad, niidud, sood, rannaniidud ja väikesaared.	Saabub märtsis, aprillis läbiränne. Lahkuvad septemברי lõpust novembrini, mõnel aastal jääb mõni üksik lind ka talvituma.	Kõrvukräts - temal aga veidi pikemad tiivad, mille tagaserv on laialt valge, kõht viirutatud.	Pesa maas, sageli mõne põõsa varjus.	vähe
Linnud	merivart	Aythya marila	IIkat	Äärmiselt ohustatud	Vahetab suletikku sõltuvalt hooajast. Pesitsushooajal isase pea sügavroheline ja rinnaesine valge. Selg hallitriibuline. Pesitsushooja lõppedes roheline peasulgedest kaob ning ka rinnaesine muutub tumehalliks. Emase kael on tumepruun ja keha tumpruun. Noka juures suur valge laik.	saar	Avamere laidudel ja saartel	Kevad ja sügis	Tuttvart - selg üleni must. Merivardil puudub tuttvardile tunnuslik suletutt. Tuttvardi emaslinnul puudub suur valge laik noka juures, kuid noka juures võib esineda kitsas valge riba.	Eestis väga haruldane pesitseja, kuid arvukas läbirändaja ning talvitaja.	vähe
Linnud	laanepeü	Bonasa bonasia	IIIkat		Jässaka kehaga, seljasulestik hall, tumedamate pruunikate ja hallide tähnidega umbes hakisuurune kanaline. Keha alapool sulestiku põhitoon on valge. Tiivad ja küljed on roostepruunid, laigulised. Isaslinnu kurgualusel must laik, silmade kohal ere punane triip ning kuklatutt. Emaslinnu kurgualune on valkjas, kuklatutt mõne väikse sulega.	mets	Okas-segametsades.	Paigalind.		Lend on madal ning seda saabab iseloomulik vürin. Kõige väiksem metsakanaline	palju

Linnud	hüüp	Botaurus stellaris	IIkat	Ohulähedane	Kollakaspruuni üldtooniga, pealagi ja selg tumedamad, keha alapool heledam. Kogu sulestik on pruuni ja mustaga kirjatud, enamik triipe on pikki keha. Emas- ja isasilind sarnased, isasilind tunduvalt suurem.	veekogu, kallas, rannik	Suurte roostikega madalaveelised veekogud.	Saabub aprilli esimesel poolel, lahkub peamiselt oktoobris. Üksikud võivad talvituda.	Hallhaigur, kellega lennupilt sarnane, kuid hüüp on väiksem ja pruuni sulestikuga	Lennu ajal tõmbab kaela rohkem õlgade vahele. Harva vaadeldav.	keskmiselt
Linnud	valgepõsk-lagle	Branta leucopsis	IIIkat		Valged põsed ja laup. Säravmust osa algab pealaelt ja ulatub õlgadeni. Selg ja tiivad musta-valge triibulised. Alakeha ja kõht on helehallid.	põld, niit, rannik	Merelähedased põllud, heinamaad ja rannaniidud.	Peamiselt rändepeatuste aegu sügisel ja kevadel.	Kanada lagle - temal valge ainult kurgualune. Lisaks on ta hoopis kogukam.		vähe
Linnud	punakael-lagle	Branta ruficollis	IIIkat		Pea enamuses must, põsel kitsa valge äärisega suur punane laik. Kael ja puguala roosteprunasid, muu keha on musta-valgekirju.	põld, niit, rannik	Merelähedased põllud, heinamaad ja rannaniidud.	Meil harv läbirändaja.		Sageli koos valgepõsk-lagledega, sisemaal väga harva	puuduvad
Linnud	kassikakk	Bubo bubo	I kat	Ohualdis	Aastaringselt samas sulestik. Suurim kakuline meil. Emaslinnud isastest kuni kolmandiku võrra suuremad. Isaste "kõrvad" on püstisemad kui emaste omad. Hästi äratuntav mänguhäälitsus on madal kaheasilbiline "uu-uu".	mets, soo	Rabamännikud, avaramad okasmetsad.	Paigalind. Parim aeg nägemiseks-kuulmiseks varakevadel.		Õise eluviisiga.	keskmiselt
Linnud	hiireviu	Buteo buteo	IIIkat		Jõulise keha, ümara pea ja lühikese sabaga. Tavaliselt tumepruun, valgetähiilise keha alumise küljega. Tiibade alaküljel on valge lai joon. Nokk ja jalad kollased. Emane ja isane lind on sulestikult samasugused. Noorlinnud on sarnased vanalinnule.	mets, muu	Pesitseb metsades ja jahti peab avamaastikel.	Pesitusperioodil märtsist septembr-oktoobrini.	Karvasjalg-viu - tema on hoopis heledam, tiibade alaküljel peaaegu valge. Ta meil ainult taliküla. Herilaseviu - temal aga on tiivad ja saba pikem, lennus hoiab pead ettesirutatuna.	Kõige tavalisem kulliline Eestis.	keskmiselt
Linnud	karvasjalg-viu	Buteo lagopus	IIIkat		Laiade tiibadega, tumeda kõhuga, pea tavaliselt hele. Tiibade alaküljel peaaegu valge. Saba valge, tumeda laia triibuga saba tipus. Jalad kollased ja karvadega kaetud.	muu	Avamaastikul	Läbirändel märtsist maini ja septembrist oktoobrini. Mõned jäävad talvituma.	Hiireviu - tema on tumedam. Tiibade alaküljel lai valge joon.		puuduvad
Linnud	niidurüdi	Calidris alpina schinzii	I kat		Selg pruuni-mustakirju, kõht must, küljel heledam ja laiguline.	niit, rannik, soo	Lääne-Eesti rannaniidud, rabad.	Saabuvad alates aprillist, lahkuvad juuli lõpuks.	Kövernokk-rista, leeterüdi, plütt, rüüt, plüü, soorüdi.	Raskesti määratav soorüdi alamliik.	keskmiselt
Linnud	merirüdi	Calidris maritima	IIIkat		Helehall pruunide tähnidega kõhualune. Selja ja pea sulestik suvel pruunikas, talvel hall. Jalad apelsinkoore värvi. Emas- ja isasilind väga sarnased.	rannik	Kivised rannad, harva mudastel ja liivastel randadel.	Eestis harv küla, sattudes siia vaid talviti.	Soorüdi - temal on kõhualune must ning kes talvitub väga harva. Talvel sarnaseid liike praktiliselt pole.	Ohtu märgates tõstab nii emas-kui isasilind ühe tiiva õhku.	puuduvad
Linnud	öösoor	Caprimulgus europaeus	IIIkat		Kehakujult kää ja piirtaja vahepealne. Suured silmad, sulestik paljudes erinevates pruunikates toonides.	mets, soo, nõmm	Avarad rabamännikud ja nõmmemetsad, eelistab harvema taimeistikutega puistuid.	Saabub mais ja lahkub septembris.		Õise eluviisiga, istub oksal pikki oksa.	keskmiselt
Linnud	krüüsel	Cepphus grylle	IIkat	Ohualdis	Suhteliselt väike, hundsulestik on must, seljapoolel roheka varjundiga ja tiival suure valge laiguga. Alapool on pruun ja jalad punased. Puhkesulestiku alapool on mustjas-pruun valgete tähnidega, alapool aga valge.	veekogu, rannik	Avameri, kaljused, kivised mererannad	Mai-oktoober.	Alk	Eestis pesitseb 10-20 paari.	üksikud
Linnud	väiketüll	Charadrius dubius	IIIkat		Täiskasvanud lindudel puunikashall selg ja tiivad, valge kõht ja valge rind koos musta kaelusega. Pruun pealagi, valge otsaesine. Silma ümber kollane rõngas. Nokk on must, jalad tuhmilt roosakad.	veekogu, kivi, karjäär, rannik	Pesitseb kiviklibul mageveekogude ääres, sageli karjäärides, kruusaaukudes või mererannas.	Saabub aprilli algul ja lahkub augusti-septembris.	Livatüll - puudub kollane rõngas silma ümber.	Toitub meelsasti mudastest kohtadest, mere ääres. Sageli sisemaal.	keskmiselt
Linnud	liivatüll	Charadrius hiaticula	IIIkat	Ohulähedane	Pruunikashall selg ja tiivad, valge kõhualune ja valge rind koos musta kaelavõruga. Pealagi on pruun, otsaesine valge, silmade ümbrus must, nokk ja jalad oranžikad.	rannik, kivi, karjäär	Pesitseb liival või kiviklibul mererannikul, harvem sisemaal kruusaaukudes.	Saabub aprilli algul ja lahkub augusti-septembris.	Väiketüll - temal silma ümber kollane rõngas.	Liigutused kiired, liigub paari meetri kaupa joostes.	keskmiselt
Linnud	mustviies	Chlidonias niger	IIIkat	Ohulähedane	Tiirudele sarnane tuhkhall kuni must rästasuurune lind. Saba ja tiivad hallid, alapool valkjas, laup valge.	veekogu	Taimestikurikkad siveekogud	Saabub mais, lahkub augusti-septembris.			keskmiselt

Linnud	valge-toonekurg	Ciconia ciconia	IIIkat		Sulestik on valge, tiivatipud mustad. Jalad ja nokk punased.	pöid, asula	Pesa sageli tehisalusel, korstnal, elektripostil		Saabub märtsi lõpus-aprilli keskel, lahkuvad augusti lõpus-septembri alguses.		Tumm lind, märku annab ta endast vaid nokaplaginaga.	palju
Linnud	must-toonekurg	Ciconia nigra	I kat	Ohustatud	Sulestik must, rinnast sabaaluseni valge. Nokk ja jalad punased. Isas- ja emaslind sarnased. Rände ajal ja talvel nokk pruunikam, paaritusajaks värvub erkpunaseks.	mets, nõmm, soo	Suuremad metsamassiivid, lodumetsad, segametsad, nõmme-männikud.		Isaslinnud saabuvad aprilli alguses, emaslinnud paar nädalat hiljem. Lahkuvad augusti lõpul – septembri algul, emaslinnud varem.		Pesa asub tavaliselt oksal, puutüvest eemal	keskmiselt
Linnud	vesipapp	Cinclus cinclus	IIIkat		Ümara keha ja lühikese sabaga, pea pruun, rinnaesine valge, kõhualune päkklikarva, mis läheb üle mustaks. Selg ja tiivad on pruunid, tumedamate tähnidega. Nokk on peaaegu must, jalad tumehallid.	veekogu	Kiire vooluga, madalamad jõed ja ojad, harvem järvede ääres.		Saabub oktoobris-novembris, lahkub märtsis-aprillis.		Nõksutab keha üles-alla.	üksikud
Linnud	madukotkas	Circaetus gallicus	I kat	Äärmiselt ohustatud	Tiivad laiad ja küllaltki paindlikud, saba kitsa tugeva tagaservaga. Värvuselt heledates toonides, pealt hallikaspruun ja alt on peaaegu valge, tumeda tähnilise mustriga. Pea ja puguala on reeglina tumedamad, silmad kollakas-oranžid.	niit, raiesmik, põlendik	Niidud, raiesmikud, põlendikud.		Väga haruldane külaline, igal suvel ei pruugi meil kohata.		Pesa kõrgemal puu otsas, igal aastal ehitab uue pesa.	puudevad
Linnud	roo-loorkull	Circus aeruginosus	IIIkat		Isaslinnu tiivaotsad selgepiiriliselt mustad, saba ühevärviine sinakashall, pea ja rind kollakasvalged, tiiva ülalpool kolme või nelja värvi. Mõni väga hele, kuid punapruuni kõhu ja pruunika varjundiga pealtiva kattesulgedel. Emaslind on tumepruun, kukal, kael ja tiiva eeserv hallikasvalged, sageli heleda rinnalaiguga.	veekogu, kallas	Pesitseb veekogude ääres roostikus või taimestikurikastes kohtades.		Kevad-suvi.	Soo-loorkull, välja-loorkull, hiireviu.	Lennul on tiivad lamedas V-asendis.	keskmiselt
Linnud	välja-loorkull	Circus cyaneus	IIIkat	Ohulähedane	Pärani puula täiskasvanud lindudel valge. Täiskasvanud lindudel kollased silmad. Isaslind ühtlaselt valkjashall, tiiva alapool valge, tiivaotsad mustad, pea ja rind tumedamad. Emaslind pruunikas, tiibade all valged triibud; kõht ja saba on heledamad ja pikitriibulised. Noorlinnud on emaslindude sarnased.	niit, soo, võsa	Pöösastunud luhad ja sood.		Saabub märtsi lõpus-aprilli alguses, lahkuvad augusti lõpus-septembri alguses.	Soo-loorkull - isaslinnul tiiva alapool tumedate tähnide ja triipudega, laiemalet mustad tiivaotsad. Emaslinnul selgelt üle küüna-hoosulegede ülalpool kulgev tume vööt.	Lisaks lendamisele kõnnivad ja hüppavad saaki otsides, pesamaterjali kogudes ning pesast uitama läinud poegade otsimiseks.	vähe
Linnud	soo-loorkull	Circus pygargus	IIIkat	Ohulähedane	Isaslindudel tiiva ülalpool must triip, tiiva alapool on hall, tumedate tähnide ja triipudega. Emaslinnud sulestiku poolest päris sarnased stepi-loorkulli ja välja-loorkulli emastega. Alapool enamasti kahvatu, pruunikaskollast värvust. Ülaosa ühtselt tumepruun välja arvatud sabaosa ning tiibade veidi kahvatum keskmine kattesulestik. Noorlinnud pealt roostekarva, alapool triibuline ja silmade peal ning all on heledad kaared.	soo, võsa, pöid, niit	Pöösassood, kõrge taimestikuga alad, saagilend põldude, heinamaade, luhtade ja rabade kohal.		Saabub aprilli teisel poolel, lahkub augustis-septembris.	Välja-loorkull - isaslinnul tiiva alapool valge, emaslinnul tiiva all valged triibud. Stepiloorikull - emas- ja noorlindudel heledam "krae".	Võib pesitseda ka põllumajandusmaadel.	keskmiselt
Linnud	õõnetuvi	Columba oenas	IIIkat	Ohulähedane	Ümber haki suurune lind, sulestiku üldvärv hallikassinine. Keha alapool tumedam ja selg pruunika varjundiga. Kaelal ja rinnal veinpunane laik ning rohekad laigud mõlemal pool kaela. Tiiva- ja sabaotsad on tumepruunid.	mets	Salumetsad, vanemad männikud.		Märtsist oktoobrini, üksikud isendid võivad talvituda.	Kaelustuvi - temal pikem saba ja valge laik küljkaelal. Kodutuvi - temal valge tiivaalune.	Pesitseb vanas musträhni pesaõõnsuses. Sobiva õõnsuse puudumisel rajab pesa lahtisele puutüvale.	keskmiselt

Linnud	siniraag	Coracias garrulus	I kat	Äärmiselt ohustatud	Sulestikus domineerivad eri toonides sinised, pea koos kaelaga ning rinnaesine koos alakaelaga on rohekassinised, selg punakaspruun. Isas- ja emaslind on välimuselt sarnased. Noorlinnud on tuhmimate värvidega ning nende kael ja rind on pruunikasroosa.	mets, muu	Hõredad metsad, männikud, avamaastikud.		Saabub aprilli lõpus-mai alguses, lahkub augusti lõpus või septembri alguses.		Väga haruldane liik.	üksikud
Linnud	rukkirääk	Crex crex	IIIkat		Seljasulestik tumepruun, näib nagu oleks selg soomustega kaetud. Keha alapool helepruun, muutudes punakaspruunideks vöötideks. Kurgualune, rind ja pea külged on hallikassinised. Nokk on lühike ja tugev.	niit, põid	Niisked niidud, põllud, heinamaad.		Saabub mai lõpus, lahkuvad septembris.		Eriline, rütmikas ja kõva hääl, laulab päeval ja öösel. Lendu tõusta ei armasta, jookseb väga kiiresti.	keskmiselt
Linnud	väikekuik	Cygnus columbianus	IIkat	Ohualdis	Isas- ja emaslind sarnased, isane natukene suurem. Sulestik valge. Nelinurkse või ümardunud kujuga sidrunkollane laik nokatüvikul, mis ei ulatu sõorme alla. Nokal must ala selgelt suurem kui kollane osa.	rannik, veekogu	Rannik, järved, ülejutatud poldrid.		Läbirändaja, saabub märtsi lõpus-aprilli alguses, lahkuvad pesitsusaladele mai esimeses pooles. Sügisel oktoobris-novembris.	Laululuik - temal kollane mustatipuline nokk, mille kollane ala ulatub sõorme alla.		vähe
Linnud	lauluik	Cygnus cygnus	IIkat		Kühmnokk-luige suurune, üleni valge, sirge kaela ja saleda joonega luik. Täiskasvanul nokatüvik laialt kollane, ots must. Noorlinnud on nokatüvik roosakas. Noorlinnud pruunikashallid. Lennul kael sirgelt ees, tiivad laiad, harali hoosulgedega. Jalad lühikesed, mustad, ujulestadega.	veekogu, soo	Meri, suuremad järved. Pestivad paarid peidetumatel rabajärvedel, merelahtedel.		Läbirändaja, peatub märtsist maini ja oktoobrist detsembrini. Üksikud isendid ka pesitsevad või talvituvad.	Väikekuik - nokal kollane laik väiksem kui on must osa	Ei painuta kaela ega tõsta sulgi kohevile nagu kühnokk-luik.	keskmiselt
Linnud	valgeselg-kirjurähn	Dendrocopos leucotos	IIkat		Tiivad musta-valgevöödilised, sabaalune roosakaspunane. Isaslinnul punased suled pealael, emaslinnu pea üleni must.	mets, niit, asula, park	Niisked, vanemate puudega segametsad ja salu-lehtmetsad, eelistab kasepuid. Püsiniidud, linnades parkides.		Püsivad enamasti paigal aastaringiselt.	Suur-kirjurähn - õlal suur valge laik. Isaslinnul kuklal väike punane laik.		keskmiselt
Linnud	tamme-kirjurähn	Dendrocopos medius	IIIkat		Aastaringiselt samas sulestikus, emas- ja isaslind erinevad. Isase rähni kukalt ehtiv punane "mütsike" ulatub kuklataha, emasel vaid pealael. Valged "pagunid" õlgadel, roosa sabaalune, mustad triibud alaküljel.	park, mets	Vanad pargid, lehtmetsad.		Paigalind.	Suur-kirjurähn - õlal suur valge laik. Isaslinnul kuklal väike punane laik. Kõht valge.		üksikud
Linnud	väike-kirjurähn	Dendrocopos minor	IIIkat		Meie rähnidest kõige väiksem. Ainuke kirjurähn, kellel puudub sabaalusel punakas värvus. Isaslinnud on punase, emaslinnud musta pealaega. Must selg valgevöödiline.	mets, park	Metsad, pargid, kalmistud. Leht- ja segametsad.		Paigalind, osaliselt rändab talveks lõuna poole.	Valgeselg-kirjurähn - sabaalune roosakaspunane. Suur-kirjurähn - palju suurem, sabaalune punane.		keskmiselt
Linnud	musträhn	Dryocopus martius	IIIkat		Üks suuremaid rähniliisi Eestis. Mõlemad sugupoolel on üleni mustad, isasel on terve pealagi punane, aga emaslinnul on ainult väike punane kuklalaik.	mets	Puhtad männikud, lehtmetsad. Enim vanades suuretüvelistes segametsades.		Enamasti paigalind, sügiseti osad isendid rändavad.		Väga pelglik ja arg. Pesa sageli lageraialangil säilikuudes.	keskmiselt
Linnud	põldtsitsitaja	Emberiza hortulana	IIkat	Ohualdis	Vanalinnud sarnased, mõlemal kollakas kurgualune ning kollakasroosa rind ja kõhualune. Emaslinnu ja noorlinnu pugalal ja pealael on tume triibustus. Silma ümber kollakas võru.	põid	Põllumajandusmaastik.		Saabub aprillis-mais, lahkub septembris.		Eestis suhteliselt vähearvukas. Levinud enam Lääne- ja Põhja-Eestis.	keskmiselt

Linnud	väikepistrik	Falco columbarius	I kat	Ohualdis	Tiivad piklikud ja teravatipulised. Isaslinnud on emastest väiksemad. Isaste ülalpool sinakas-hall mustade suleroodudega, alalpool oranžikas ja piklike tumepruunide tähnidega. Emas- ja noorlinnud sarnase sulestikuga: ülalpool tumepruun hallika varjundiga, roostepruunide vöötidega, alalpool ookerjas ja piklike tumepruunide tähnidega.	muu	Looduslikult mitmekesised, vahelduvate kooslustega maastikud.		Aprillist oktoobrini, vahel ka talvitub siin. Kevaditi ja sügiseiti läbirändel.			vähe
Linnud	rabapistrik	Falco peregrinus	I kat		Jõulise kehaehitusega, voolujoonelise sulestikuga. Saba ja jalad suhteliselt lühikesed, varbad pikad, tugevate küünistega. Tiivad pikad ning teravad. Sulestiku ülalpool on hallikaspruun ning tumepruun, alalpool valkjas ja roostekarva triipude või laikudega. Emaslind umbes kolmandiku võrra isasest suurem.	soo	Suured rabad.		Saabub märtsis, lahkub septembris. Harva ka talvitub meil.		Vii mane pesitsus tehti Eestis kindlaks 1971. aastal.	üksikud
Linnud	lõopistrik	Falco subbuteo	III kat		Suhteliselt väike pistrikuline. Ülalpool paasi-karva hall, alalpool aga valge selgete tumedate triipudega. Tiivad piklikud ja teravad, saba suhteliselt lühike.	mets	Männikud.		Saabub mais, lahkub septembris-oktoobris.	Punajalg-pistrik	Võib suvel sageli kohata avamaastikul õhust kiile jt. putukaid püüdmas.	vähe
Linnud	tuuletallaja	Falco tinnunculus	III kat	Ohulähedane	Väike sale pistrikuline. Isalinnu ülalpool on telliskivipunane pruunide tilgakujuliste laikudega, alalpool ookeri värvi ja pruunitähniine. Emalinnu ülalpool roostekarva ja pruunide vöötidega, tiivad piklikud ja saba suhteliselt pikk.	põid	Kultuurmaastikud.		Aprillist oktoobrini, harvem talvitub.		Saagijahil olevale linnule on iseloomulik raplev lend kohapeal	vähe
Linnud	punajalg-pistrik	Falco vespertinus	III kat		Isalinnu ülalpool sinakas-hall. Jalad, alalpool, silmade ümbrus ning nokk punased. Emalinnu ülalpool hall, tumedate pruunikashallide vöötidega. Pea ja alalpool oranžid ning silmade ümbrus tume. Tiivad on piklikud ja teravatipulised. Emaslind on isasest suurem.	muu	Looduslikult mitmekesised, vahelduvate kooslustega maastikud.		Aprillist septembrini.		Meil harva esinev haudelind.	üksikud
Linnud	väike-kärbsenäpp	Ficedula parva	III kat		Aastaringselt samas sulestikus. Ülalpool pruun, alalpool valkjas. Emase kurgualune on helepruun, isase oma aga hoopis silmapaistvalt oranž.	mets	Tihedamad kuusikud ja kuuse-segametsad.		Saabub aprilli lõpus-mais, lahkub august-september.		Peatumisel nõksutab tihti saba ja kehitab tiibu.	palju
Linnud	rohunepp	Gallinago media	II kat	Ohualdis	Pika sirge noka, jässaka keha, pikkade jälgadega ja pruunikirju sulestikuga lind. Rinnal, kõhu all tugev ja selge vöödistus. Maas seisval linnul selgelt näha valge tiivavööt. Välimised sabasuled laialt valged.	niit, soo	Jõelammed, luhaniidud, madal- ja siirdesood.		Saabub aprilli teises pooles, lahkub augustis-septembris.	Tikutaja - väiksem, saledam ja pikema nokaga.	Rohust lendutõus peaaegu hääletu ja sirgjooneline.	keskmiselt
Linnud	tait	Gallinula chloropus	III kat		Tume sulestik, punane laubakilp, valged küjetriibud, valged sabaaluse kattesuled. Punane nokk on kollase otsaga. Mõlemast soost linnud on sarnased, isane on emasest veidi suurem. Kollased pikad jalad on pikkade varvastega.	veekogu	Järved, tiigid, seisva ja liikuva vee ja lopsaka taimestikuga veekogud.		Saabub aprilli keskpaigas, lahkub septembris-oktoobris.	Lauk - nokk ja laup valged.	Nõksutav ujumisstiil. Meil rohkem Lõuna-Eestis.	üksikud
Linnud	järvekaur	Gavia arctica	II kat	Äärmiselt ohustatud	Hane suurune tume lind. Sejal valged tähnid, terav nokk, pikk ja jäme kael, väga lühike saba. Emas- ja isaslind on üksteisele sarnased.	veekogu, rannik	Rändel rannikumerele, pesitseb suurematel siseveekogudel.		Kõige arvukamalt kevad- ja sügisrände ajal aprillist-juunini ja septembrist-oktoobrini.		Väga harv haudelind	üksikud

Linnud	punakurk-kaur	Gavia stellata	lilkat		Vahetab sõltuvalt aastaajast sulestikku. Talvesulestik ülalt mustvalge-kirju ja altpoolt silmapaistvalt valge. Punane kurk asendub talvel valge kurguga. Hundsulestikus halli pealae ning punase kurguga. Emas- ja isaslind on üksteisele sarnased.	rannik	Rannikumeri		Läbirändaja kevadel sügisel, lisaks talvitub igal aastal meie vetes päris palju linde.		Viimane pesitsev punakurk-kaur leiti Eestist 1947. aastal.	üksikud
Linnud	värkakk	Glauclidium passerinum	lilkat		Aastaringsest sarnase välimusega. Umbes kuldnoka suurune. Ülapool tumepruun väikeste valgete tähnidega, valkjal alapoolel hõredad triibud. Silmad suured ja kollased nende kohal heledad kulmud. Nokk kollane.	mets	Vanad kuusikud, kuuse ülekaaluga segametsad, vahel männikud.		Aastaringsest, parim aeg sügis-talv.		Suluspesitseja.	keskmiselt
Linnud	sookurg	Grus grus	lilkat		Halli sulestikuga, tumedate jalgadega ning heleda nokaga suur lind. Näol on selgesti eristatav valge laik ning vanalinnu pealae on punane laik. Iseloomulik kohev sulgedest „saba“.	soo, raiesmik, kallas, niit, põld	Sood, niisked raiesmikud, rabad, roostikud, niidud ja põllud.		Märts-oktoober		Pesa on hästi varjatud suur taimekuhi maapinnal.	palju
Linnud	merikotkas	Haliaeetus albicilla	I kat	Ohulähedane	Tiibade sirutus kuni 2,5 meetrit. Noorlindude sulestik üleni tumepruun, nokk must. Vanalindude sulestik heledam, kael ja pea kahkjapruunid. Noka must värvus asendub järk-järgult pleekinud kollase värvusega, jalad kollased. Vanalinnul valged sabasuled. Lennupildis hoiab laialisirutatud saba ja kaela keha pikiteljest madalamal.	mets, veekogu, muu	Rohkem Lääne-Eestis ja Peipsi vesikonnas. Täiskasvanud linnud enamasti paiksed ja pesapaiga lähedase ümbruse truud aastaringsest. Talviti läänerannikul lahtise vee läheduses.		Paigalind.		Pesa tavaliselt mõne suurema männi või haava otsas.	keskmiselt
Linnud	suitsupääsuke	Hirundo rustica	lilkat		Sügavalt harkis saba. Sulestiku ülapool läikiv-sinkjasmust ja alapool peamiselt kreemikasvalge. Laup ja kurgualune roostepunased.	põld	Külamaastik		Saabub aprilli keskpaigas, enamasti mai alguses. Lahkub alates augusti keskpaigas kuni septembri keskpaigani.			vähe
Linnud	väänkael	Jynx torquilla	lilkat		Ülapool pruuni- ja hallitähniline, alapoolel tumedad viirud heledal taustal. Läbi silma ja piki kaela kulgeb tume joon. Teine tume joon keset selga. Saba pikk hõredate vöötidega.	mets, niit, asula, park, aed	Hõre puistu, puisniidud ja linnapargid, aed		Saabub aprilli lõpus-mai alguses, sügisränne peamiselt septembris.		Pesitseb sageli pesakastides	keskmiselt
Linnud	rabapüü	Lagopus lagopus	I kat	Ohustatud	Umbes varese suurune. Ema- ja isaslind sarnased. Talviti valged, saba ja nokk must. Kevadel pea, kaela, rinna ja eesleja värvus tellisepruun, ülejäänud keha valge. Suvel valged vaid tiivad, kõhualune ja jalad. Muu sulestik on punakaspruun. Emaslind on veidi pruunim. Sügiseti näevad linnud välja samasugused, kui kevadel.	soo	Rabad, siirdesood.		Paigalind.		Pesa tavaliselt männi all või tihedas puhmastikus.	vähe
Linnud	punaselg-õgija	Lanius collurio	lilkat		Umbes talvikese suurune tugev ning jässakas lind. Noka tipp konksjas. Isalinnul on pruunikaspunane selg ja tiiva kattesuled ning üle silmade ulatuv must triip. Pea, kael ja nimmepiirkond on hallid, tiivad tumepruunid, saba must valgete servadega. Kurgualune, rind ja kõht on valged, külgedel ja puguala servadel on roosat värvi.	mets, niit, võsa	Hõredad leht-, sega- ja okaspuistud, sagedamini puisniitudel ja põõsastikkudes.		Saabub mai keskel, lahkuvad augustis, septembris.		Saaki märgates sööstab noolena selle poole ja napsab osavalt õhust kui ka maapinnalt. Rohus liukuvat saaki luurab rappelennul nagu kull, püüdes ägedalt tiibu liigutades ühel kohal.	palju

Linnud	hallõgija	Lanius excubitor	Ilkat	Ohulähedane	Umbes väikese rasta suurune pika sabaga lind. Linnu ülapiil on tujukhall, alapool valge, mustad tiivad ja saba üksikute valgete sulepartidega. Silma läbib lai must triip. Noorlindude alapoolel esineb triibustus, mis talveks kaob. Isas- ja emaslind sarnased.	soo, võsa, mets	Rabad, põõsarasbad ja hõredad puisrasbad.		Saabub märtsis-aprillis, lahkub septembris-oktoobris		Pesa pesaegu alati rabamännil. Lend lainjas, teeb rappelendu.	keskmiselt
Linnud	tõmmukajakas	Larus fuscus	Ilkat	Ohustatud	Jalad intensiivsed roosakad/kollased, nokk kollane, punase laiguga. Selg ja tiivad mustad, väga väikeste valgete laikudega tiivaotstel. Pea on talvel hallikas. Noorlindudel on mustjaspruun mustriuga keha pealpool.	rannik, veekogu, kallas	Mererannad, suuremate järvede ääres.		Saabub märts-aprill, lahkub septembris-oktoober.	Merikajakas - erineb merikajakast väiksema kasvu, saledama kere ning pikemate ja kitsamate tiibade, samuti peenema noka poolest. Hõbekajakas - temal aga helehallid tiivad.	Pesitseb kolooniates	vähe
Linnud	väikekajakas	Larus minutus	Ilkat	Ohualdis	Tiivapealne helehall, tiivaalune tuhmumust. Hundrüüs on pea kuni kaelani süsimust. Puhkesulestikus pea must värvus puudub.	veekogu, niit, rannik	Madalatel taimestikurohketel järvedel, luhtadel kui ka madalatel rannikumärgalad el.		Arvukus kevadel ja sügisel rände ajal.	Naerukajakas - pea tume osa lõpeb kuklapoolel. Tiivaalused valged.	Ainuke musta tiivaalusega lõpeb kuklapoolel. Tiivaalused Ida-Eestis.	keskmiselt
Linnud	vöötsaba-vigle	Limosa lapponica	Ilkat		Keskmise või suurema kasvuga kurvitsaline. Pikk ülespoole kaardus roosa tipuga tume nokk. Kael, rind ja kõht on hundsulestikus telliskivikarva ja talviti valkjäs. Selg on mõlemal ajal tähtselt hallikas. Jalad on hallid. Emane on veidi suurem kui isaslind, pikema nokaga ja hundsulestikus võib puududa punakas värv. Noorlindud sarnanevad talvesulestikus vanalindudele.	rannik	Liivaste ja mudaste kallastega rannikud.		Läbirändel mais ja juuli lõpust poole septembrini.	Mustsaba-vigle - tema nokk sirge.	Meil tavaline läbirändaja.	puuduvad
Linnud	mustsaba-vigle	Limosa limosa	Ilkat	Ohulähedane	Nii isaslinnul kui ka emaslinnul lai valge tiivavööt. Pikad hallid jalad. Pikk sirge oranzikas nokk. Kael ja rind punakaspruunid. Rinna alumine osa ja kõht valged, tumedate pikivöötidega. Sabaots must. Noorlindudel hele kulmutriip ning hallid põsed. Puhkesulestik on neil enamasti hall.	soo, niit, rannik	Sood, niisked niidud, rändel luhtadel ja randadel.		Saabub aprilli alguses, lahkub august-september.	Vöötsaba-vigle - nokk kõver ja tume.		keskmiselt
Linnud	männi-käbilind	Loxia pytyopsittacus	Ilkat		Meenutab veidi papagoid tänu oma nokale: nokaotsad kõverad ja omavahel risti. Isaslinnud punased või oranzhid, emased rohekad või kollakad, sulestiku värvuses on palju variatsioone. Tiivapealsed tavaliselt tumedamad kui keha, kohati pruunika toonini välja. Sabaalune valge, mustade tähnidega. Noorlindud hallikad, tugevate triipudega.	mets	Männikud		Invasiooniliik	Kuuse-käbilind - väiksem nokk ja väiksem pea. Sulestiku järgi neid kahte raske eristada.	Väikesearvuline	vähe
Linnud	nõmmelõoke	Lullula arborea	Ilkat		Hallikaspruuni värvi, puguala ja rinnal tumedamad triibud. Kulmukaar valkjäs. Sabaots valge ja lühem kui teistel lõokestel. Lagipeal suletutt.	nõmm, mets, raiesmik	Nõmmed, nõmmemetsad, loometsad, liivased raiesmikud.		Saabub märtsi lõpus, lahkub augusti lõpust kuni oktoobrini.		Lend lainjas ja tõukeline. Väga iseloomulik laul.	keskmiselt
Linnud	luha-sinirind	Luscinia svecica cyaneacula	Ilkat		Enam-vähem varblase suurune. Põhitoonid tumedad, kontrastne hele kulmutriip. Isaslinnu pea, kurgualune ja puguala rukkiliiselinised. Emaslinnul siniseid toone pole. Kõht ja rind valged.	võsa, niit, veekogu, soo	Põõsaniidud, kraavikallaste pajupõõsad, kinnikasvavate tiikide ja lompide ümbrus, põõsassood, luhad.		Saabub aprilli lõpus-mai alguses, lahkub septembris-keskel.	Tundra-sinirind	Sageli ajab saba püsti ja laiali. Raskesti määratav sinirinna alamliik.	üksikud
Linnud	mudanepp	Lymnocyptes minimus	Ilkat	Ohualdis	Umbes lõokese suurune. Nokk kuni 4 cm. Rinnal ja külgedel kreemjaskollakad pikitriibud, selg ja õlad roheka metalliläikega, tumedamate täppidega. Kõht valge. Pealagi must, silmade kohal kaks kollast triipu.	soo, niit	Soised alad, üleujutatud luhad.		Märtsist septembrini, vahel oktoobrini.	Tikutaja - tema on suurem ja pikema nokaga.	Pesitseb älverabades	üksikud

Linnud	tõmmuvaeras	Melanitta fusca	IIIkat	Puuduliku andmestikuga	Aastaringelt sarnase välimusega. Isaslinnu keha sügavmust, nokk oranž. Emaslind tuhmpruun, beežika põsega. Iseloomulik on valge tiivaküüsus.	rannik	Rannikumeri		Arvukaim kevadrändel.	Mustvaeras - isaslinnu nokk kollane. Emasel rohkem beeži põsel. Üleni tume lind.		keskmiselt
Linnud	väikekoskel, pudukoskel	Mergellus albellus	IIkat		Isaslinnul valge pea, kael ja rinnus, selg, silmade ja noka vaheline ala must, peas valge tutt. Kukkalt rinnuseni jookseb mõlemalt poolt keha tagurpidi V-kujuliselt mustad triibud. Emaslinnu pea roostepruun, kurgualune valge, mujalt hall. Nokk ja jalad mõlemal sugupoolel hallid.	rannik, veekogu	Lääneranniku merelehtedel, Peipsil, Võrtsjärvel.		Tavaline läbirändel nii kevadel kui ka sügisel, talvel väikesearvuline	Jääkoskel - temal on rohekas pea.	Eestis ei pesitse.	üksikud
Linnud	must-harksaba	Milvus migrans	IIIkat	Äärmiselt ohustatud	Emas- ja isaslinnud sarnased. Ülapool tumepruun. Nokk ja küünised mustad, jalad kollased. Tiivad piklikud ja ümarate otstega, tiival hele põikvööt. Saba suhteliselt pikk ja väheke harkis. Emaslinnud isastest veidi suuremad. Noorlinnu sulestik helepruun roostjate tähnidega.	mets, veekogu, muu	Niisketes metsades ja suuremate jõgede ja järvede ümbruses. Saagijahil avamaastikus.		Aprill-september.	Roo-loorkull - puudub tiiva peal hele põikvööt.		üksikud
Linnud	kuldhänilane	Motacilla citreola	IIIkat	Ohulähedane	Isaslinnul pea kollane, must kuklatriip. Puhkesulestikus isalinnu pealgi muutub halliks. Emaslinnu pealgi ja selg hall, põskede ja kukla tumedamate piirkondade vahelt jookseb läbi noka juurest algav kollane triip. Isas- ja emaslinnul valge sabaalune. Tiiva hoosulgedel on laiad valged äärised.	kallas, niit	Veekogude kaldad, madalamad karjamaad.		Saabub valdavalt aprilli keskpaigas, lahkub septembris.	Hänilane - tema selg on kollakas-või pruunikashall, samuti on tal valge silmatriip. Jõgivästriks - isaslinnul on kurgu all must laik, emaslinnul tumedal taustal valge laik.		üksikud
Linnud	hänilane	Motacilla flava	IIIkat		Alapool kollane või kollakas, selg kollakas- või pruunikashall, pika saba äärmised suled valged, selgesti eristatav kulmutriip.	niit	Niidud, karjamaad, jõeluhad.		Saabub aprilli lõpus-mai alguses, lahkub septembris.	Kuldhänilane - isaslinnul pea kollane.		keskmiselt
Linnud	suurkoovitaja	Numenius arquata	IIIkat		Jalad pikad, nokk väga pikk ja peenike, selgelt allapoole kaardunud. Tiivad piklikud, üsna terava tipuga. Sulestikud emas- ja isalindudel ühesugused: hallikas-pruunikas vöödiilised, selja tagumine osa ning saba- ja kõhualune on valged. Tiibade alapool on valkjas-helehall.	niit, soo	Niisked niidud, heinamaad, luhad, sood, rabad. Järvede, jõgede ning ojadega külgnevatel niitudel ja karjamaadel.		Aprillist oktoobrini.	Väikekoovitaja - tema pealael ja -külgedel on selgemini väljajoonistuvad heledad ja tumedad triibud.		keskmiselt
Linnud	väikekoovitaja	Numenius phaeopus	IIIkat	Ohulähedane	Emas- ja isaslinnu sulestikud ühesugused, emaslind isasest natuke suurem. Sulestik hallikas-pruunivöödiilise. Tagaselg ning saba- ja kõhualune valged. Tiibade alapool heledat tooni. Jalad suhteliselt pikad, nokk pikk ja peenike ning selle tipuosa allapoole kaardunud. Tiivad on piklikud ning üsna terava tipuga.	rannik, soo	Rändel sageli mererannikul, pesitseb üksnes rabades		Aprillist oktoobrini.	Suurkoovitaja - suurem ja pikema nokaga.		keskmiselt
Linnud	lumekakk	Nyctea scandiaca	IIIkat		Isaslind peaaegu täiesti valge, mõne harva tumedama tähniga. Emas- ja noorlinnud valged, sulgedel pruunikaid ja halle tähne. Jalad kaetud sulgedega.	muu, kallas	Avatud maastikud, rändel veekogude kallastel.		Haruldane taliküline novembrist aprillini			puuduvad
Linnud	kalakotkas	Pandion haliaetus	I kat	Ohualdis	Eesti kotkastest väikseim. Tume ülapool on tugevas kontrastis heleda alapoollega. Pea valge. Lai silmatriip mis kulgeb seljani. Üle valge rinna kulgeb tumedam püguvööt. Kuklal pikematest sulgedest tutisarnane osa. Tiivad tumedad, hoosuled ja sabaalune tumedatriibulised. Küüned ja nokk mustad. Emas ja isaslind sarnased.	veekogu	Madalate kalariikaste veekogude lähedus.		Saabub aprillis-mais, lahkub augustis-septembris.		Pesa tavaliselt männi ladvas.	keskmiselt

Linnud	herilaseviu	Pernis apivorus	Ilkikat		Nokk must, kael ja kõht pruuni-valge täpilise. Selg enamasti pruun. Isalinnu pea sinakashall, emalinnul pruun. Silmad kollased. Emalind isasest natuke suurem ja tumedama sulestikuga.	mets	Suured metsad.		Saabub aprillis, lahkub septembris.	Hiireviu. Herilaseviul on väiksem pea, peenem kael, pikem ümarate nurkadega saba ning pikemad ja kitsamad tiivad. Herilaseviul on erkkollased silmad, samuti noka kollane on rohkem noka juurel.	keskmiselt	
Linnud	veetallaja	Phalaropus lobatus	Ilkikat		Emalinnu keha ülalpool tumepruun, seljal kollased laigud. Pea hundsulestikus tumepruun, kurgualune valge. Ümber kaela kulgeb lai roostepunane vööt. Puguala ja keha küljed emalinnul hallikaspruunid, muu keha alalpool aga on valge. Hundsulestikus isalinnul roostepunane vööt tunduvalt nõrgem, mis paikneb kaela külgedel. Nokk must, jalad mustjasrohelised. Puhkesulestikus ei ole roostepunast vööti. Laup, ala- ja külgael ning kogu ülejäänud keha alalpool on valged. Toitumise ajal ujub kergelt õngekorgina, liigutused kiired.	niit, rannik	Madalad lombid rannaniitudel või madalas rannavees		Mai-september.	Eestis pesitseb 0-5 paari.	üksikud	
Linnud	tutkas	Philomachus pugnax	I kat	Ohustatud	Hundsulestikus isasel kirevalt värviline 'kohev' ülakeha, pealael tutid. Nii isasel kui emasel on selg hallikaspruun ja kõht valge. Nokk on tumearanž, tumeda tipuga. Emase pea pruunitribuline ja rind rindalt telliskivikarva, tumedate triipudega. Jalad kollased. Talvesulestikus mõlemal alakeha, valge pealpool hallikas.	niit, veekogu	Niisked rohumaad, rändel rannikul ja sisemaa mudased veekogud.		Läbirändel aprilli lõpust maini ja juuli lõpust septembrini. Osad linnud jäävad suvel pesitsema.	Iseloomulikud mänguplatsid rannaniitudel ja luhtadel, kus toimuvad turniirid isaste vahel.	keskmiselt	
Linnud	laanerähn	Picoides tridactylus	Ilkikat		Aastaringselt samas sulestikus. Isase kukalt ehib kollane "mütsike", emase pealagi on ühtlaselt must-valgekirju. Selg valge, pea musta-valgetriibuline, isasel on kiird kollane. Jalgadel on kolm varvast: kaks on ette, üks taha suunatud.	mets	Vanemad puistud, kus rohkelt kuivanud puid.		Paigalind	Vajatud eluvisiga, häälitseb harva ja koputab vaikset.	keskmiselt	
Linnud	hallpea-rähn	Picus canus	Ilkikat		Keha pealtpoolt roheline, kollaka pärani-pualaga, altpoolt hallikas. Pea ja kukal hall, peenike must haberiba, silma ja noka vahel peenike must silmalaiik. Isalinnul väike punane laik otsmikul, emalinnul punane laik puudub. Nokk lühike ja sale.	mets, soo, niit	Valgusrikkad sega- ja okasmetsad, lodu-sanglepikud, puisniidud, jõelammid.		Paigalind.	Roherähn - trummeldab harva. Roherähnil on pealagi laialt punane.	Lend on tõttik ja kiire, puude vahel põiklev ja üles-alla kõikuv.	keskmiselt
Linnud	roherähn	Picus viridis	Ilkikat	Ohustatud	Seljapealne sulestik ja tiivad kollakas-oliivrohelised, alalpool hallikasroheline. Pärani-puala erekollane. Roherähni kiirupealsel punased suled, silma ümbrus must. Nokk suhteliselt pikk ja saba lühike. Isalinnul punane laik silma all.	mets, niit, park	Lehtpuupuistud, puisniidud, pargid.		Paigalind.	Hallrähn - trummeldab rohkem. Hallrähni isalinnul on vaid väike punane laik otsmikul ning emalinnul punane laik otsmikul puudub. Hallrähni haberiba on aga peenike must triip.	Esinemine teada vaid Saaremaal.	üksikud

Linnud	rüüt	Pluvialis apricaria	Ilkat		Hundsulestikus kuldse-musta tähnilise pealae, tiibade ja seljaga. Nägu ja kael must, valge äärisega. Rind ja kõhualune mustad, sabaalune valge. Jalad mustad või tumehallid. Talvel pea ja rind kollakas, alakeha valge.	soo, põld, niit	Pesitseb vaid rabades, rändel ka põldudel ja heinamaadel		Saabub märtsis-aprillis, lahkub augustis-septembris.	Plüü. Plüü on suurem kui rüüt, toekama nokaga. Ülakeha on hõbedasem/kuldsem. Hundsulestikus on plüü must värv toekam ja ulatuslikum. Lennul on plüüd lihtne eristada tiivaaluse kerepoolse musta järgi, valge tiivatribu ja sabaaluse valge järgi. Rüüdi musta ja kerevärvil vahel jookseb terves pikkuses valge triip, plüül on see triip vaid rinnani.		palju
Linnud	sarvikpütt	Podiceps auritus	Ilkat	Ohulähedane	Isas- ja emaslinnud sarnased. Hundsulestikus on rohkelt pruuni ning isearalikud oranžid "sarved" peas, puhkesulestik peaaegu must-valge, pealagi must, põsed valged, kael ja selg hallikad.	veekogu, rannik	Väikestel ja madalaveelistel jäänukjärvedel, tiikidel, rannikul.		Saabub aprillis-mais, lahkub augustis-oktoobris.	Mustkael-pütt - tema on väiksem, tutid väiksemad ja kael must. Väga haruldane eksikulaline.		keskmiselt
Linnud	hallpõsk-pütt	Podiceps grisegena	Ilkat	Ohulähedane	Isas- ja emaslinnude välimused sarnased, hund- ja puhkesulestik erinevad. Hundsulestikus kael punane, puhkesulestik peaaegu must-valge, segatud hallidesse toonidesse. Nokk on mustjas, kollaka tüvikuga.	veekogu, rannik	Väikestel ja madalaveelistel jäänukjärvedel ja tiikidel, rannikul.		Saabub aprilli lõpuks, lahkub septembris-oktoobris.			vähe
Linnud	kirjuhahk	Polysticta stelleri	Ilkat	Ohustatud	Aastaringelt sarnase välimusega. Isaslinnu pea, rind ja küünrakattesuled valged või kergelt sinakad, kuklaosa suled on rohekad, silmarõngas ja kurgualune mustad, puguosa punakaspruun. Emaslind ookerpruun.	veekogu, rannik	Rannikumeri		Novembrist-detsembrist kuni aprilli-maini.		Tegutseb sageli väga tihedates parvedes	üksikud
Linnud	väikehuik	Porzana parva	Ilkat	Ohualdis	Jässaka kehaehituse, pikkade jalgade ja lühikese kaelaga. Nokk roheline, punase tüvega. Jalad rohelised. Sulestik kõhu alt halli, pealaest alates algab aga pruunikates toonides sulestik. Emaslinnul valge kurgualune ja nägu, beežikas kõhualune. Noorlind sarnaneb emaslinnule.	kallas	Tegutseb hundiniuade ja pilliroo vahel.		Saabub aprillis- mais, lahkub septembris-novembris.	Täpikhuik - sulestik täpiiline.	Meil väikesearulune haudelind. Kuuldakse peamiselt häälsusi, väga harva vaadeldav.	üksikud
Linnud	täpikhuik	Porzana porzana	Ilkat		Jässakas, jämeda kaelaga ning suurte jalgadega. Täpiiline, kaugelt näib lind üleni tumne. Sulestik kõhu alt hallikas, seljalt roostepruun. Nokk kollane, peale lähemal muutub oranžikaks, noortel üleni pruunikas-kollane. Valge sabaalune.	soo, niit, kallas	Madal- ja siirdesoodel, luhtadel, niisketel niltudel, järvekallastel.		Saabub mai alguses, lahkub septembris.	Väikehuik - temal punane nokatüvi.	Tavaline haudelind. Kuuldakse peamiselt häälsusi, väga harva vaadeldav.	keskmiselt
Linnud	rooruik	Rallus aquaticus	Ilkat		Seljaosa pruunikas, alapool tumedam. Külgedel kitsad valged triibud vaheldumisi mustade laiade triipudega. Nokk helepunane, pikk ja veidi kõvera otsaga. Pikad varbad ja punased jalad.	kallas, rannik	Roostikud		Saabub aprillis, lahkub oktoobris, üksikud talvituvad.		Õise eluviisiga, liikumisel nõksutab saba. Kuuldakse peamiselt häälsusi, väga harva vaadeldav.	keskmiselt
Linnud	naaskelnokk	Recurvirostra avosetta	Ilkat	Ohulähedane	Sulestik mustvalge, nokk pikk ja ülespoole kõver. Pea nokast alates kukla taha välja must, põsed valged. Keha üleni valge, tiivade ääred moodustavad aga musta ovaali tiiva ümber. Lennul nähtavad kaks musta triipu seljal. Emastel aimatav silmarõngas. Noorlindudel seljapealne sulestik pruunika viirutusega.	rannik, niit, saar	Rannaniidud, laiud		Saabub aprilli keskel-mai alguses, lahkub septembris.		Peamiselt Lääne-Eestis.	keskmiselt
Linnud	kaldapääsuke	Riparia riparia	Ilkat	Ohulähedane	Meie väikseim pääsuke. Keha pealpool pruun, alumine pool valge. Rinnal jookseb pruun triip.	veekogu, karjäär	Vee lähistel kõrgete kruusa- või liivakallastega paikades, karjäärides		Saabub aprillis-mais, lahkub augustis-septembris.		Pesitseb kolooniatena uuristades pesakoopad liiva või kruusa sisse	vähe

Linnud	koldvint	Serinus serinus	Ilikat	Ohulähedane	Jämeda kaelaga, väikese nokaga. Alakeha tugevate triipudega. Isaslind on sidrunikollase peaga ja rinnaga, emaslindudel ja noortel kollast vaid alakehal. Keha pealpool pruunikashall, veidike kollast sees.	mets, park	Avarad okaspuudega metsad ja pargid.		Saabub aprillis, lahkub oktoobris.		Sageli linnades ja alevites.	üksikud
Linnud	väiketir	Sterna albifrons	Ilikat	Ohulähedane	Isas- ja emaslind sarnased. Hundsulestikus linnud must pealagi, laubal valge laik. Nokk kollane, musta tipuga, jalad kollased. Puhkesulestik sarnane hundsulestikule, puhkesulestikus pealagi valgem ja nokk on must.	rannik	Mererannik		Saabub aprilli lõpus, lahkub juulis-augustis.		Pesitseb sageli üksikute paaridena, harvem hõredas kolooniates.	keskmiselt
Linnud	räusk	Sterna caspia	Ilikat	Ohualdis	Jalad mustad, nokk pikk jäme punakas-oranzh, musta tipuga. Pealagi must, kael, kõht ja saba valged. Keha pealmine osa helehall, tiivaalused heledad. Talvesulestikus pealagi must heledate triipudega.	rannik, saared	Mererannik, laiud		Saabub aprilli lõpus, lahkub juulist septembrini.		Maailma suurim tiiruliik.	vähe
Linnud	jõgitir	Sterna hirundo	Ilikat		Isas- ja emaslind sarnased. Pealagi nokani must, nokk punane musta tipuga, selg helehall, kõht valge, jalad punased. Puhkesulestik sarnane hundsulestikule, puhkesulestikus vaid pealagi valgem ja nokk on must.	veekogu, rannik, kallas	Lahed, sisemaa järvede rannad, suuremad jõed.		Saabub aprillis-mais, lahkub augustis-septembris.	Randtiir - temal nokk punane, jalad lühemad.		keskmiselt
Linnud	randtiir	Sterna paradisaea	Ilikat		Isas- ja emaslind sarnased. Pealagi nokani must, nokk üleni punane, selg helehall, kõht valge ning jalad punased. Puhkesulestik sarnane hundsulestikule, puhkesulestikus pealagi valgem ja nokk tumedam. Noorlindude jalad ja nokk on mustad ja otsaesine valgem kui vanalinnul.	rannik, saared	Mererannik, laiud		Saabub aprilli lõpus-mai alguses, lahkub juulis-septembris.	Jõgitir - temal nokk musta tipuga ja jalad pikemad.		keskmiselt
Linnud	tutt-tiir	Sterna sandvicensis	Ilikat		Keskmiest kasvu tiir, nokk must kollase tipuga. Lühikesed mustad jalad. Keha pealpool on helehall ja tiivaalused valged. Pealagi must, kuklas iseloomulik tutt, mis ärrituse korral püsti tõuseb.	rannik, saared	Mererannik, laiud		Saabub aprillis, lahkub septembris.			vähe
Linnud	kodukakk	Strix aluco	Ilikat		Suuruselt rongja ja vārese vähepealne. Sulestik üle keha täpiline, hallikas või punakaspruun. Selja pealt jääb kodukakk üldmuljelt pruunikaskollaseks, eespoolt heledam, kus domineerivad valged ja pruunid toonid. Saba on alt heledam, umbes kolmandiku keha pikkune. Nokk kollane ja küüned kollakasmustad.	põld	Kultuurmaastikud.		Paigalind.		Enamasti kuuleb ainult pikka ja kaugelekestvat huiget.	keskmiselt
Linnud	habekakk	Strix nebulosa	Ilikat		Suurimaid kakulisi. Ühtlaselt halli värvi, hallikasmustade triipudega, lennus näha tiivaotstel kollakat tooni. Pea üsna lame, näos iseloomulikud „aastarõngad“, silmad kollased.	mets	Okas- ja segametsad.		Kogu aasta		Aktiivne nii öösel kui ka päeval.	üksikud
Linnud	händkakk	Strix uralensis	Ilikat		Suur, hallikasvalge, pika sabaga kakuline. Nokk kollane, silmad mustjaspruunid, Nägu tuhkhall. Tiibade siruulatus 1,3 meetrit. Emaslind isaslinnust oluliselt suurem.	mets	Suured metsamassiivid.		Paigalind.		Pesitseb suurtes õõnustes, murdunud kõrgetes kändudes, kulliliste ja ronkade risupesades, suurevalistes pesakastides.	keskmiselt

Linnud	vöötakk	Surnia ulula	Illkat		Püstise kehahoiakuga, rind kaetud heledaviirilise sülestikuga, tiivad, selg ja saba tumedate pruunide sülestikuga. Seljal ohtraid valgeid sulgi. Suur nurgeline pea, põsed ääristatud mustaga, otsmikul silmapaistev hele V-kujund. Silmad suured ja väävelkollased.	põld	Kultuurmaastikud.		Talvel.		Üksikud paarid võivad jääda pesitsema	puuduvad
Linnud	vööt-pöösälind	Sylvia nisoria	Illkat		Isaslinnu ülalpool tuhkhall, emaslinnul pruunikam. Alapool valkjas, tumedate vöötidega. Nokk väike. Suurim pöösälind. Silma vikerkest kollane.	võsa, park	Pöösastikud, pargid, kadastikud.		Saabub mai teises pooles, lahkub augustis.		Peidulise käitumisega liik.	keskmiselt
Linnud	väikepütt	Tachybaptus ruficollis	Illkat	Ohulähedane	Isas- ja emaslindude välimused suhteliselt sarnased. Suvesülestikus pea ja kukal must. Põsed ja kaela esipool tumepunakas-pruunid. Selg must, küljed pruunid. Silma ja noka vahel valge laik. Talvesülestik ühtlaselt hallikas-pruun, põsed heledamad ning silma ja noka vahel kollakas laik.	veekogu, rannik	Lahesopid, väiksemad järved, aegse vooluga jõed.		Aastaringelt, kuid väga haruldane.			üksikud
Linnud	ristpart	Tadorna tadorna	Illkat		Nii emas- kui ka isaslinnul kirev sülestik. Erkpunane nokk, tumeroheline kael ja pea, valge puguala, pruun vööt ümber keha ning tumedad ribad külgedel. Isaslinnul silmatorkav kühm nokatüvikul.	rannik, saared	Mererannik, saared.		Saabub aprillis-mais, lahkub oktoobris.		Varahommikul sageli katustel mängimas.	keskmiselt
Linnud	teder	Tetrao tetrix	Illkat	Ohulähedane	Kodukana suurune. Isaslinnul must sinaka helgiga sülestik. Valgeid sulgi tiibadel ja lüürakujulisel sabal. Emaslind pisut väiksem, ühtlaselt tumedat pruuni värv. Nii emas- kui ka isaslinnul on kulumul punakas näsa.	raiesmik, soo, niit, mets	Raiesmikud, soode ja heinamaadega piirnevad metsad.		Paigalind.		Iseloomulikud mänguplatsid, kus kuked mängivad	keskmiselt
Linnud	metsis	Tetrao urogallus	Illkat	Ohualdis	Isaslinnud musta sülestikuga. Suur saba moodustab mängu käigus uhke suure „lehviku“. Isaslinnust 40% väiksem emaslind pruunika sülestikuga, rinnal iseloomulik suur roostepunane laik.	mets, soo	Vanad lehtpuude lisandiga okasmetsad, marjarikkad puisrabad.		Paigalind.		Esineb vaid Mandri-Eestis.	palju
Linnud	mudatildid	Tringa glareola	Illkat		Pikad jalad, pikk peene ning sirge must nokk. Pruunikas mustriline selg ja pea, kurk ja rind pruunide tähn-triipudega. Kõhualune valge. Jalad rohekashallid, silma juures kulmutriip.	soo, rannik	Pesitseb vaid rabades, rändel tavaline mererannikul.		Aprill kuni septembri keskpaik.	Metstildid.		keskmiselt
Linnud	heletildid	Tringa nebularia	Illkat	Ohulähedane	Sülestiku üldtoon hallikas-pruun, tagaselg ja kõhualune valged. Nokk pikk ja tüme, veidi ülespoole kaardunud. Jalad pikad ja rohekad. Puhkesülestik heledam ja kahvatum kui pesitsusaegne sülestik.	soo, rannik	Pesitseb vaid rabades, rändel tavaline mererannikul.		Aprill-september.	Mudatildid. Mudatildid tiivapealsed on tähnliisemad, heletildid omad ühtlasemid pruunikad.		vähe
Linnud	punajalg-tildid	Tringa totanus	Illkat		Sülestik helepruun, tagaselg ja kõhualune valged. Tiiva tagaserval valge vööt. Nokk sirge, keskmise pikkusega. Noka ots tüme, tüveosa punakas. Jalad oranžikad-punased. Emaslind isalinnust natuke suurem.	niit, rannik, veekogu	Luhad, niisked rannaniidud, veekogude äärsed heinamaad.		Aprill-oktoober.			palju
Linnud	hoburästas	Turdus viscivorus	Illkat		Suur rästas. Ülalpool pruun, alapool kollakas või valge, ththeadate ümarate tähnidega. Tiivasulgedel heledad äärised. Isas- ja emaslind ei erine välimuselt.	mets	Kuivad valgusrohked männikud.		Saabub märtsi lõpus-aprilli alguses, lahkub oktoobris.	Laulurästas - hoburästast selgelt väiksem		keskmiselt

Linnud	vaenukägu	Upupa epops	Ilkikat	Ohualdis	Sulestiku põhitoon kollakaspruun. Laiad tiivad ja saba mustad, tiibadel valged vöödid, sabal lai valge ristivööt. Pealael oranžidest musta tipuga sulgedest tutt. Nokk kõver ja kuni 4 cm pikk.	niit	Kuivad karjamaad, niidud.		Saabub aprilli lõpus, lahkub augustis.		Sageli inimasustuse lähedal.	üksikud
Linnud	taiga-rabahani	Anser fabalis fabalis		Ohualdis	Tumepruun pea ja kael eristuvad heledamast rinnast. Nokk pikk, musta-oranžikirju.	põld, niit	Rändel toitumas kõrre- ja orasepõldudel, heinamaadel.		Läbirändel märtsis-aprillis ja septembrist novembrini.	Hallhani - temal aga jämedam kael ja suurem pea. Värvuselt ühtlasemalt hall. Lühinokk-hani - temal aga ümar pea ja lühike nokk, jalad roosad. Selg helehall, peenikese valge vöödistusega. Suur-laukhani - kõhul on korrapäratud mustad ristitriibud. Valge lauk ja roosakas-oranžikas nokk.	Rändab varem kui tundra-rabahani A.f. rossicus	
Linnud	põhjavint	Fringilla montifringilla		Ohualdis	Kirju sulestik, valge päranipuala. Kaks valget vööti tiival. Isalinnul on kevadel ja suvel pea ja eesseg must, kurgualune ja puguale roosakas. Emaslinnul on sulestik kollakaspruun, alapoole hele ja puguale kreemjas.	mets, muu	Rändel sageli avamaastikus ja selle servades. Pesitseb soistes kaasikutest ja segametsades.		Esineb aprillist kuni oktoobrini. Elavamad rändeajad aprillis ja mai alguses ning septembri lõpul ja oktoobri alguses.	Metsvint. Põhjavindi puguale on oranžikas, metsvindi punane. Põhjavindi tiibadel on samuti näha oranži.	Pesa teeb ta kuusele, kasele või leppale (pigem kõrgele, ~6 m maapinnast). Väga haruldane pesitseja Eestis.	
Linnud	sinirind	Luscinia svecica		Ohualdis	Äratuntav valkja kulmutriibu ja roostepunase laigu järgi sabaüviku külgedel. Isalinnu kurgualune ja puguale on puhassinised, mille allservas kitsas mustvalge ja laiema roostepunane vööt. Sügisel muutub osa puhassinistest puguale sulgedest kollakasvalgeteks. Emaslinnu puguale enamasti hallikasvalge mustade tähnidega. Peenikesed pikad jalad.	niit, võsa, rannik	Avarad maastikud nagu puisniidud, põõsastega rannaniidud, rannik ja luhad.		Aprilli lõpp, mai algus, augusti lõpp, september.	Emaslinnu võib segamini ajada paljude teiste samamõõtu värvulistega.	Laulmiseks sobib mõni põõsalatv või aiapost.	
Linnud	luitsnokk-part	Anas clypeata		Ohulähedane	Lusikataoline lai nokk. Isalinnu puguale ja eesseg on laialt valge, pea ja kael roheka läikuga mustjaspruunid, kaelalt seljale kulgeb mustjaspruun triip. Selg on tumepruun, kõht kastanpruun. Emalind on pruun ookerja üldtooniga.	rannik, veekogu, kallas	Rannik (taimestikurikkad merelähed), harvemini siveveekogud. Juunist alates kogunevad isalinnud sulgima roostikurikastele aladele.		Läbirändaja. Saabub aprillis ja lahkub oktoobris.	Esmapärgul sarnane enamuse partidega.	Väikesearvuline haudelind.	
Linnud	rägapart	Anas querquedula		Ohulähedane	Pesitsusrüü. Isalinnul lagipea lillakaspruun, valge poolkuukujuline vööt üle silma ja kuklakülje. Rind tumepruun, kehaküljed helehallid, õlasuled must-valged ja teravatipulised. Emalind piilpartist pisut kogukam, üleni hall nokk suurem ja tugevam, vähemärgatav tume triip põsel ja hele valjaslaik noka eel, mistõttu pea näib triibulisena; sabaküljel pole heledat laiku.	veekogu, niit	Pesitseb madalatel rohketoidulistel mageveekogudel, samuti ranna- ja lamminiitudel.		Saabub aprillis ja lahkub septembris-oktoobris.	Piilpart. Rägapart on suurem kui piilpart, pikema ja tugevama noka ning pikema sabaga.	Hauelind ja läbirändaja.	
Linnud	hallhani	Anser anser		Ohulähedane	Sulestik peaaegu ühtlaselt pruunikashall, pea ja kael üsna heledad. Lennul on näha nii pealt kui alt kontrastselt helehall tiiva eesserv. Üleni roosakas nokk ja tuhmroosad jalad.	rannik, kallas, veekogu, saared	Pesitsus: rannikuäärsed roostikud, tiheda taimestikuga rannikujärved ja väikesaared. Läbiränne: peatuvad suurte parvedena merelähedastel põldudel ja rohumaadel, harva sisemaal.		Esimesed võivad saabuda veebruari lõpus. Enamik saabuvad märtsis ja ja lahkuvad oktoobris-novembrist.	Suur-laukhani - kõhul on korrapäratud mustad ristitriibud. Valge lauk ja roosakas-oranžikas nokk. Rabahani - pea ja kael pruunid, eristuvad hallist rinnast. Lühinokk-hani - temal aga ümar pea ja lühike nokk. Selg helehall, peenikese valge vöödistusega.	Hauelind ja läbirändaja.	

Linnud	põldvutt	Coturnix coturnix		Ohulähedane	Helepruuni sulestikuga lind. Selg ja küljed kollase, pruuni ning mustaga kribumustriliner. Kõhualune hele. Pea tumedam ja peslaelt jooksevad kuklasse helekollased triibud. Kukul on nokaalune must ja musta-valgetriibuline kurk. Kanadel ja noorlindudel on muster väiksemate täppidega ja üle põse jooksevad kaks musta triipu.	muu, põid	Lagedad kultuurmaastikud, enamasti teravilja- ja heinapõllud (taimestik mitte väga madal ega väga kõrge).		Esimesed saabuvad aprillis, enamis siiski mai teises pooles. Lahkuvad augustis.	Sulestiku värvus on sarnane mõnede teistele põllulindudele. Aga suuruselt ja häälitsusest ei sarnane keegi.	Kaitsev värvus - näha on võimalik ainult siis, kui lind ehmunut lendu tõuseb. Õhku tõuseb aeglaselt ja lendab aeglaselt. Soovib esimesel võimalusel maanduda.
Linnud	nurmkana	Perdix perdix		Ohulähedane	Jässakas, ümmargune kere ja pea. Peamiselt hallikaspruun sulestik, "nägu" ja kurgalaune oranžpunased, tiibadel kastanpruunid ristvöödid, rind tuhkhall ja peenevüriline, kõhul suur hobuserauakujuline mustjaspruun laik. Emaslinnu kõhualune laik on tunduvalt väiksem ja ähmasem. Noorlind on kollakas- ja hallikaspruun.	põid, niit, mets, aed, asula	Põllud ja niidud, samuti ka kultuurmaastiku lähedusse jäävad metsasihid, metsalagendikud ja aiad. Paksu lumikatte korral tulevad inimasulate ja teede lähedusse.		Talvel, varakevadel kuulda hämaras mänguhäälsusi.	Põldvutt - tema on hoopis väiksem ja heleda kõhuga. Rukkirääk - tema keha pole nii jässakas kui nurmkanal.	Enamasti liiguvad joostes, lendu tõusevad peamiselt siis, kui oht ähvardab või on vaja liikuda kaugemale. Lendab madalalt ja kiirelt, tiibadega veheldes või liueldes. Talvel sageli saalkades.
Linnud	kukkurthane	Remiz pendulinus		Ohulähedane	Hall pea, must mask (emalinnul vähem intensiivne), punakaspruun selg. Koonusjas nokk. Tiival tume roostepunane laik, kõht kollakas.	kallas, rannik	Kinnikasvanud ja roostunud luhad, jõe- ja järvekaldad ning mereranniku lahesopid.		Saabub aprillis (vahel varajasematel kevadatel juba märtsi viimastel päevadel). Sügisel lahkuvad septembri lõpu, oktoobri alguses.	Punaselg-õgija - temal on pigem lai must silmatriip. Emalinnul silmatriip pruun. Roohabekas - tema üldvärvus pigem oranžikas-kollakaspruun. Astmeliselt lühenev valge servaga saba. Isalinnu eritunnuseks on efektsed pikad musta värvi sulgedest vuntsid.	Pesa: peente okste tipus rippuv hele piklik-kerajas kinnine kukkur, mille ühel küljel on torukujuline ripats - sisepääsutunnel. See on valmistatud taimeliidudest ja -villast ning võib säilida mitu aastat.
Linnud	hahk	Somateria mollissima		Ohulähedane	Suur ja jässaka kehaehitusega sukelpart. Laup läheb sujuvalt üle heledaks nokaks. Isaslind on pesitsetes valge seljaga, musta kõhualuse, külgede ja tagaosaga. Valge pea on musta kiiru ja roheliste kuklikülgedega. Emalind on pruun, tumedate vöötidega, heleda nokaga. Isaslind siirderüüs (rände ajal) väga tüme, vöötideta. Noorlind sarnaneb emalinnule, kuid tumedal tiivaküüduusel pole valget serva ning pea ja ülalpool on ühetoonilised.	saared	Väikesed meresaad, vahel harva ka suurte saarte pikad merre ulatuvad neemed. Üldiselt eelistab siiski rannast kaugemal olevaid ja kivisemaid saari. Metsastunud saartel asustab hahk vaid selle rannikut, kadakasse kasvanud osa hülgab aga alles siis, kui enam kuidagi läbi ei mahu.		Saabub kevadel märtsi lõpul (varajase jäämineku või jäätumata mere korral ka varem). Põhjapoolsete pesitsete läbiränne kestab mai keskpaigani. Sügisene läbiränne algab juulis-augustis isaslindude sulgima tulemisega, oktoobris-novembris rändavad läbi ja lahkuvad ka emas- ja noorlinnud.	Kirjuhahk.	Lennul jätab raskepärase mulje - tiivad laiad ja suhteliselt lühikesed, tiivalõigid aeglasel, pead hoiab pisut allapoole.
Linnud	kaelus-turteltuvi	Streptopelia decaocto		Ohulähedane	Külgkaelal kitsa valge äärisega must vööt. Sulestik üsna ühetaoline hele kreemikashall. Lennul eristub õõnetuvist pisut aeglasemate tiivalõikide, suuruse ja oluliselt pikema saba poolest.	asula, park	Enamasti linnades ja alevites, parkides		Paigalind	Kodutuvi, õõnetuvi. Suurem kui kodutuvi ja suhteliselt pikema saba ja väiksema peaga, rinnakam, kuid siiski pikema kerega.	
Linnud	soorüdi	Calidris alpina		Ohustatud	Seljalt varieeruvalt roostepruun. Pea hallikam, rind vöödilise. Kõht kontrastselt must. Pikk sale kergelt kaardus nokk. Nokk ja halad mustad.	rannik, veekogu	Soorüdi pesitseb rannikuäärses tundras. Talvitumise ajal võib kohata ka luhtadel, soodes ja siseveekogude randades. Eestis pesitseb peamiselt soorüdi alamliik niidurüdi.		Läbirändel aprillist juuni alguseni ja juulist oktoobrini.		Toitu otsivad nad kõndides kas väga madalast veest või vee piirilt, nokkides toitupalasid.
Linnud	tuttiõoke	Galerida cristata		Äärmiselt ohustatud	Hallikaspruun ja pika terava kiirututiga, mis on nähtav ka siis, kui see on loidusse tõmmatud. Rinnal on pisut ähmased triibud. Ülatiib ühetooniline, alatiib roostjas, nokk pikk ja teravatipuline, alanokk sirge.	asula, muu	Avakultuurmaastik, jäätmaad.		aprillist septembrini	Põldlõoke - temal aga tiibadel heledam tagaserv ja valged äärmised sabasuled. Nõmmelõoke - temal aga pikad heledad kulmutriibud. Suletutt peal on märgatav, aga mitte terav.	Eksiküaline, (ebaregulaarne hauldelind).